

سفر شات برائے دھان (31 تا 16 اگست 2026)

کھادیں اور آبپاشی

- موسمی کاشتہ فصل میں نائٹروجنی کھاد کا استعمال مکمل کر لیں جبکہ پھمپیتی کاشتہ فصل میں کھاد کا استعمال فصل کی صورت حال کے مطابق کریں۔
- نائٹروجنی کھاد کے استعمال کے وقت کھیت میں پانی کی مقدار کم سے کم ہو۔
- موسمی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق آبپاشی کا خاص خیال رکھیں۔

کیڑوں اور بیماریوں سے متعلق سفارشات

پتہ لپیٹ سڈی (Leaf Roller)

- دھان کی پتہ لپیٹ سڈی پتوں کو لپیٹ کر اندر سے کھاتی ہے، جس سے پتوں کا خوردہ بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور پودے کی نشوونما اور پیداوار میں نمایاں کمی آتی ہے۔ کیڑے کے حملے کو بروقت کنٹرول کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات از حد ضروری ہیں۔
- ہفتہ وار بنیاد پر دھان کی فصل کی باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔ نائٹریٹنگ اور کنٹرول کے لیے روشنی والے پھندوں کا استعمال کریں۔
- کھیت سے تمام جڑی بوٹیوں کو تلف کریں۔ نائٹروجنی کھادوں کا حد سے زیادہ استعمال نہ کریں۔
- مفید کیڑوں جیسے مکڑیاں، پیراسائیکلک و سپیس، اور ڈریگن فلائیز وغیرہ کی افزائش کی حوصلہ افزائی کریں۔
- کیڑے کا حملہ معاشی نقصان کی حد سے زیادہ ہونے کی صورت میں، مقامی محکمہ زراعت (توسیع) یا زرعی ماہر کے مشورہ سے کسی بھی درج ذیل زرعی زہر کا انتخاب ان کے وقت قبل از برداشت (PHI) کو مد نظر رکھ کر کریں۔

نمبر	زرعی زہر	مقدار فی ایکڑ	وقت لپیٹ (دن)	نمبر	زرعی زہر	مقدار فی ایکڑ	وقت لپیٹ (دن)
1	نیٹرائٹنگ 18 فی صد ایس ی	100 لیٹر	33	5	ایماکسین + ایمیزامائی ہیلوٹھرن 12 فیصد ڈیلیوپی	100 لیٹر	16
2	سپنٹورام 120 ایس ی	100 لیٹر	30	6	کلورنٹرائٹنگ 20 ایس ی	50 لیٹر	14
3	ایماکسین ہینڈلڈ + ڈیڈ کسٹاپ 9 فی صد ایس ی	120 لیٹر	28	7	فیرول 5 فی صد ایس ی	480 لیٹر	14
4	سیمپامائی ہیلوٹھرن 60 فیصد ایس ی	75 لیٹر	21	8	فلوینڈیٹھائڈ 48 ایس ی	50 لیٹر	7

سنے کی سڈیاں (Stem Borer)

- دھان کی فصل خصوصاً باسیتی اقسام پر سنے کی سڈیوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے زرد اور سفید سڈیاں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جبکہ گلابی سڈی کم نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ سڈیاں سنے کو اندر سے کھاتی رہتی ہیں جس سے سنے کی کوئٹل سوکھ جاتی ہے جسے سوک یا ڈیڈ ہارٹ کہتے ہیں۔ سنے کی سڈیوں کا حملہ اگر سنے بنتے وقت ہو تو حملہ شدہ تنوں کے سٹے سفید ہو جاتے ہیں جنہیں وائٹ ہیڈ کہتے ہیں اور ان سٹوں میں دانے نہیں بنتے ہیں۔
- سنے کی سڈیوں کے حملہ کی صورت میں نقصان کی معاشی حد یعنی سوک کی شرح پانچ فیصد ہو جائے تو درج ذیل سفارش کردہ زہروں کا استعمال کریں۔

نمبر	زرعی زہر	مقدار فی ایکڑ	وقت لپیٹ (دن)	نمبر	زرعی زہر	مقدار فی ایکڑ	وقت لپیٹ (دن)
1	کلرپٹھ 4 فیصد ایس ی	9 کلو گرام	40	4	ایماکسین ہینڈلڈ + ایمیزامائی ہیلوٹھرن 12 فیصد	100 لیٹر	16
2	نیٹرائٹنگ 200 فیصد ایس ی	100 لیٹر	33	5	مونو میٹھائڈ 5 فیصد	7 کلو گرام	14
3	آکسیسائیگوسیرم 18.1 ایس ی	120 لیٹر	29	6	فلوینڈیٹھائڈ 48 فیصد ایس ی	75 لیٹر	7

بھبکا یا بلاسٹ (Blast)

- بھبکا یا بلاسٹ کا حملہ پتوں، گانٹھوں، مونجری گردن اور مونجری پر ہوتا ہے۔ پتوں پر آنکھ کی شکل جیسے نشان بن جاتے ہیں جو سازگار حالات میں بڑے ہو کر آپس میں مل جاتے ہیں اور پتے کے بڑے حصے کو خشک کر دیتے ہیں۔ مونجری گردن پر یا مونجروں پر حملہ کی صورت میں اس کے گرد سیاہی مائل نشانات ایک ہالہ بنالیتے ہیں جس سے خوردہ دانوں میں نہیں پہنچ سکتی اور دانے پورے نہیں بھر پاتے۔ تدارک کے لیے بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر کا سپرے کریں۔

نمبر	زرعی زہر کا نام	مقدار فی ایکڑ	وقت لپیٹ (دن)
1	ایزاکسی سٹروبن + ڈیٹاٹی فینوکونازول 30 فیصد ایس ی	200 لیٹر	14
2	ڈیلٹامائٹین + ڈیٹاٹی فینوکونازول 12 ڈیلیوپی	250 گرام	14-35
3	ڈیٹاٹی فینوکونازول 250 ایس ی	125 لیٹر	14

پتوں کا براؤنش جھلا (Bacterial Leaf Blight)

- یہ بیماری فصل کی پیداوار میں شدید کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس بیماری میں پتوں پر زرد و بے ہنشا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پتے مر جھانے لگتے ہیں اور خشک ہو کر نیچے کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اس بیماری پر موثر قابو پانے کے لیے درج ذیل اقدامات از حد ضروری ہیں:
- فصل میں کھادوں کے متوازن استعمال کو یقینی بنایا جائے خصوصاً پودے کا استعمال بیماری کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔

- دھان کے نقصان دہ کیڑوں بالخصوص پتہ لپیٹ سڈی کو بروقت کنٹرول کریں۔

- مقامی محکمہ زراعت کے عملے سے رابطہ کر کے درج ذیل میں سے کسی موزوں زرعی زہر کا انتخاب ان کے وقت قبل از برداشت (PHI) کو مد نظر رکھ کر کریں۔

نمبر	زرعی زہر	مقدار فی ایکڑ	وقت لپیٹ (دن)	نمبر	زرعی زہر	مقدار فی ایکڑ	وقت لپیٹ (دن)
1	ڈیلٹامائٹین + ایپکسی کونازول 24	100 لیٹر	15	4	کاپر آکسی کلورائیڈ + کڈو گامائین 47 فیصد ڈیلیوپی	240 تا 400 گرام	14
2	کڈو گامائین 2 فی صد ایس ی	600 لیٹر	14	5	کاپر ہائڈروآکسائیڈ 77 فیصد ڈیلیوپی	250 گرام	14
3	کاپر آکسی کلورائیڈ 50 فیصد ڈیلیوپی	500 گرام	14	6	ڈیلٹامائٹین 5 فی صد ایس ی	300 لیٹر	11

ہکائی (Foot Rot)

- ہکائی سے متاثرہ پودے صحت مند پودوں کی نسبت قد میں لمبے، قد میں ہارک اور پیلے رنگ میں ہوتے ہیں۔ شدید متاثرہ پودے کے پتے نیچے سے شروع ہو کر اوپر تک سوکھ جاتے ہیں اور پودہ مر جاتا ہے۔ ہکائی سے متاثرہ پودے اکھاڑ کر تلف کر دیں۔ بیماری والے کھیت کا پانی دوسرے کھیتوں میں ناجانے دیں۔

- موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بے وقت اور غیر متوقع بارشوں اور درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی یا بیشی کی وجہ سے فصلات پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نقصان دہ کیڑے اور بیماریوں کے حملہ کی شدت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ان اثرات کو کم سے کم کرنے کے لئے فصل کی خصوصی نگہداشت کریں، فصل کا باقاعدگی سے معائنہ کریں اور موسمی پیشین گوئی سے باخبر رہیں۔ فصل کی تحفظ نباتات کا خاص خیال رکھیں۔

ڈائریکٹوریٹ جنرل زراعت (توسیع)، پنجاب، لاہور، چیف سائنسٹ، رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، کالا شاہ کاکو،

جاری کردہ:

ڈائریکٹوریٹ جنرل پیسٹ وائرنگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائینڈ ز پنجاب، لاہور