

16 تا 31 اگست 2026

زرعی سفارشات

زرعی سفارشات

عبدالحمید، ڈائریکٹر جنرل زراعت (توسیع و پھیلانہ) پنجاب، لاہور

کپاس

مون سون بارشوں کے بعد کپاس کی دیکھ بھال

- ❖ مون سون بارشوں کے نتیجے میں جڑی بوٹیوں کی کثرت ہو جاتی ہے لہذا فوری تلفی کو یقینی بنائیں
- ❖ کپاس میں موجود اضافی پانی کے فوری نکاس کا انتظام کریں تاکہ مر جھاؤ (wilting) سے فصل بچ جائے
- ❖ بارشوں کے بعد ضرورت کے مطابق پودے کو نائٹروجن اور دوسرے غذائی عناصر فوری طور پر مہیا کریں تاکہ فصل کی پیداواری صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے
- ❖ بارشوں کے بعد اگر فصل زیادہ بڑھوتری کی طرف مائل ہو تو مٹی کو کلو رائیڈ بحساب 100 ملی لٹر فی ایکڑ سپرے کریں

نقصان دہ کیڑوں کا مربوط انسداد

کپاس کی سفید مکھی (Whitefly)

- ❖ کپاس کے کھیتوں اور اسکے ارد گرد جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کریں۔
- ❖ نائٹروجنی کھادوں کا استعمال فصل کی ضرورت کے مطابق کریں۔ فصل کو پانی کی کمی یا زیادتی سے بچائیں اور فصل کی ضرورت اور موسمی حالات کے مطابق آبپاشی کریں۔
- ❖ ہفتے میں 2 مرتبہ پیسٹ سکاؤٹنگ کریں جبکہ زہر پاشی کیڑوں کی معاشی نقصان کی حد پر ہی کریں۔
- ❖ متبادل میزبان فصلات مثلاً بیٹنگن، کھیرا، کدو، مریچ، جھنڈی اور تل وغیرہ پر باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ کریں اور ان فصلات پر بھی سفید مکھی کا بروقت تدارک کیا جاسکے۔
- ❖ سفارش کردہ زرعی زہروں کا استعمال مناسب وقت، مقدار اور سپرے کے موثر طریقہ سے کریں۔ ایک ہی کیمسٹری کی زرعی زہروں کے بار بار استعمال سے گریز کریں۔

❖ سپرے کی مناسب کوریج کو یقینی بنائیں (ترجیاً پاور اسپریر کا استعمال کریں)۔ سپرے کے لیے اچھی کوالٹی کی ہولو کون نوزل کا استعمال کریں۔ زرعی زہروں کا سپرے ترجیاً شام کے وقت کریں۔

❖ اگر حملہ نقصان کی معاشی حد سے زیادہ ہو تو محکمہ زراعت (توسیع) یا پیسٹ وارنگ کے عملہ کے مشورہ سے سفارش کردہ زرعی زہریں استعمال کریں۔

چست تیلہ (Jassid)

- ❖ بارشوں کے بعد ہوائیں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے جس سے سبز تیلہ کے حملہ کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے لہذا فصل کی باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔
- ❖ سبز تیلہ کی تعداد اگر ایک فی پتہ یا اس سے زیادہ ہو تو محکمہ زراعت کے مقامی عملہ کے مشورہ سے مناسب زہروں کا سپرے کریں۔
- ❖ ایک ہی کیمسٹری کی زرعی زہروں کے بار بار استعمال سے گریز کریں۔ دوست کیڑوں کے تحفظ کے لیے محفوظ کیمسٹری کی زرعی زہروں کا انتخاب کریں۔
- ❖ سپرے سے پہلے سپرے مشین کی جانچ پڑتال مکمل کریں اور ہولو کون نوزل استعمال کریں۔
- ❖ اگر حملہ نقصان کی معاشی حد سے زیادہ ہو تو محکمہ زراعت (توسیع) یا پیسٹ وارنگ کے عملہ کے مشورہ سے سفارش کردہ زرعی زہریں استعمال کریں۔

کپاس کی مٹی بگ (Mealy Bug)

- ❖ مٹی بگ کے حملہ کا بروقت پتہ لگانے کے لئے ہفتے میں باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔
- ❖ مٹی بگ کے کھیت اور کھالوں کے ارد گرد جڑی بوٹیوں خاص طور پر اٹ سٹ، کنگی بوٹی، ہزار دانی اور اکسن وغیرہ کو تلف کریں۔
- ❖ فصل کو پانی کی کمی سے بچائیں اور متاثرہ فصل سے صحت مند فصل میں ورکرز کے مسلسل داخلے سے گریز کریں۔
- ❖ حملہ شدہ پودوں پر سفارش کردہ زرعی زہروں کا سپرے متاثرہ ٹکڑیوں/فصل پر کریں۔
- ❖ متاثرہ ٹکڑیوں کی نشاندہی کریں تاکہ ان ٹکڑیوں پر مسلسل دو سپرے کیے جاسکیں۔
- ❖ اگر حملہ نقصان کی معاشی حد سے زیادہ ہو تو محکمہ زراعت (توسیع) یا پیسٹ وارنگ کے عملہ کے مشورہ سے سفارش کردہ زرعی زہریں استعمال کریں۔

کیڑوں اور بیماریوں سے متعلق سفارشات

فصل دھان میں پتہ پلیٹ سنڈی کا موثر تدارک:

دھان کی پتہ پلیٹ سنڈی پتوں کو پلیٹ کر اندر سے کھاتی ہے، جس سے پتوں کی ضیائی تالیف (Photosynthesis) متاثر ہوتی ہے اور پودے کی نشوونما اور پیداوار میں نمایاں کمی آتی ہے۔ کیڑے کا حملہ کو بروقت کنٹرول کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات از حد ضروری ہیں۔

- ❖ ہفتہ وار بنیاد پر دھان کی فصل کی باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ کریں اور کھیت سے تمام جڑی بوٹیوں کو تلف کریں۔
- ❖ مانیٹرنگ اور کنٹرول کے لیے روشنی والے پھندوں کا استعمال کریں۔
- ❖ نائٹروجنی کھادوں کا حد سے زیادہ استعمال نہ کریں۔
- ❖ مفید کیڑوں جیسے مکڑیاں، پیراسائٹک و سپس، اور ڈریگن فلائیز وغیرہ کی افزائش کی حوصلہ افزائی کریں۔
- ❖ کیڑے کا حملہ معاشی نقصان کی حد سے زیادہ ہونے کی صورت میں، مقامی محکمہ زراعت کے عملے کے مشورہ سے موزوں زرعی زہروں کا استعمال کریں۔

پتوں کے جراثیمی جھلساؤ (Bacterial Leaf Blight) کا مربوط تدارک

یہ بیماری فصل کی پیداوار میں شدید کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس بیماری میں پتوں پر زرد دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پتے مرجھانے لگتے ہیں اور خشک ہو کر نیچے کی طرف جھک جاتے ہیں۔

اس بیماری پر مؤثر قابو پانے کے لیے درج ذیل اقدامات از حد ضروری ہیں:

- ❖ فصل میں کھادوں کے متوازن استعمال کو یقینی بنایا جائے تاکہ بیماری کے امکانات کم ہوں۔
- ❖ کسانوں کو آگاہی دینے کے لیے تربیتی سیشنز کا انعقاد کیا جائے، تاکہ وہ اس بیماری سے بچاؤ اور کنٹرول کی مؤثر حکمت عملی سے آگاہ ہو سکیں۔
- ❖ مقامی محکمہ زراعت کے عملے سے رابطہ کر کے موزوں زرعی زہروں کا استعمال کریں۔

موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر فصل کی خصوصی نگہداشت

موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بے وقت اور غیر متوقع بارشوں اور درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی یا بیشی کی وجہ سے فصلوں پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نقصان دہ

گلابی سنڈی (Pink Bollworm)

- ❖ گلابی سنڈی کے حملے کا بروقت پتہ لگانے کے لئے ہفتے میں دو بار کپاس کی فصل کی پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔
- ❖ مانیٹرنگ کے لئے گلابی سنڈی کے جنسی پھندے 1 تا 2 فی ایکڑ اور کنٹرول کے لئے 9 تا 12 پھندے فی ایکڑ لگائیں اور ہر 15 دن کے وقفے سے فیرومون کپسول کو تبدیل کریں یا لمبے عرصے والے فیرومون استعمال کریں۔
- ❖ اگر حملہ نقصان کی معاشی حد سے زیادہ ہو تو محکمہ زراعت (توسیع) یا پیسٹ وارننگ کے عملہ کے مشورہ سے سفارش کردہ زرعی زہریں استعمال کریں۔

کپاس کا پتہ مروڑ وائرس (CLCuV)

- ❖ اس بیماری کی وجہ سے پتوں کی رگیں پھول جاتی ہیں، پتے عام طور پر اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف مڑ جاتے ہیں اور شدید حملہ کی صورت میں نچلی سطح پر چھوٹے پتے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس سال کپاس کی فصل پر وائرس کے اثرات زیادہ مشاہدہ میں آ رہے ہیں لہذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات بہت ضروری ہیں۔
- ❖ باغات، کھالوں اور روٹوں پر آگاہی ہوئی جڑی بوٹیاں تلف کریں۔
- ❖ پتہ مروڑ وائرس سفید مٹی کے ذریعے بہت جلد پھیلتا ہے لہذا اس کے انسداد کے لیے مختلف کیڑے مار زہروں کے ساتھ ساتھ حیاتیاتی انسداد کو بھی زیادہ سے زیادہ بروئے کار لائے اور فصل کے دوست کیڑوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔
- ❖ صحت مند فصل ہی بیماری کا بہتر مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس لیے کپاس کی قسم کے مطابق سفارش کردہ پیداواری ٹیکنالوجی مثلاً وقت کاشت، آبپاشی، تحفظ نباتات پر عمل کیا جائے۔
- ❖ زنک سلفیٹ (33 فیصد) 250 گرام، بوریکس 250 گرام اور میکینیشیم سلفیٹ 300 گرام 100 لٹر پانی میں حل کر کے بوائی کے بعد بالترتیب 75، 60، 90 دن کے وقفے سے تین پرے کریں۔

دھان

- ❖ نائٹروجنی کھاد کا استعمال اگر 15 اگست تک مکمل نہیں ہو سکا تو جلد از جلد مکمل کر لیں اور بچھتی کاشتہ فصل میں کھاد کا استعمال فصل کی صورتحال کے مطابق جلد مکمل کر لیں۔
- ❖ نائٹروجنی کھاد کے استعمال کے وقت پانی کی مقدار کم سے کم ہو۔
- ❖ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق آبپاشی کا خاص خیال رکھیں۔

باغات (آم)

- ❖ بارش کی صورت باغات میں سے فالتو پانی کے نکاس کا انتظام کریں۔
- ❖ پچھتی اقسام کے پھل کی برداشت جاری رکھیں۔
- ❖ آم کے نئے باغات لگانے کے لیے Layout (نشان دہی) کے بعد 3x3x3 فٹ کے گڑھے کھودیں ایک فٹ کی اوپر والی مٹی علیحدہ رکھیں باقی کھیت میں بکھیر دیں اور گڑھے دو ہفتے تک کھلے رکھیں۔
- ❖ تسلی بخش پودے خریدنے کے لیے رجسٹرڈ نرسری کا انتخاب کریں۔
- ❖ آم کے باغات میں نائٹروجن کھاد کی تیسری قسط بحساب 1 کلوگرام پوریا ڈالنے کا بندوبست کریں۔
- ❖ تیلے، سکیلز اور دوسرے کیڑوں کے حملہ کی صورت میں سفارش کردہ زہریں سپرے کریں۔
- ❖ پھل کی کھسی کا انسداد جاری رکھیں، جڑی بوٹی مارزہروں کا انتظام کریں۔

ترشاوہ پھل

- ❖ بارش کی صورت میں باغات میں سے فالتو پانی کے نکاس کا انتظام کریں۔
- ❖ کاغذی لیموں اور پیچھے کی برداشت جاری رکھیں۔
- ❖ سفارش کردہ کھنی کی نرسری لگائیں۔
- ❖ آبپاشی موسمی پیش گوئی کے مطابق کریں۔
- ❖ ترشاوہ پودوں کو نائٹروجن کی تیسری قسط ڈالیں۔ بہتر ہے کہ کھادوں کا استعمال تجزیہ زمین کے مطابق کریں۔
- ❖ نئے پودے لگانے کے لیے Layout (نشان دہی) کے بعد 3x3x3 فٹ کے گڑھے کھودیں۔ ایک فٹ کی اوپر والی مٹی علیحدہ رکھیں باقی کھیت میں بکھیر دیں اور گڑھے دو ہفتے تک کھلے رکھیں۔
- ❖ تسلی بخش پودے خریدنے کے لیے رجسٹرڈ نرسری کا انتخاب کریں۔
- ❖ پیوند کاری کا عمل تیز کریں نیز باغ میں پودوں کے ناغوں کا جائزہ لیں اور ناغے لگائیں۔
- ❖ کیڑوں اور بیماریوں کی شدت کا معائنہ کرنے کے بعد ان کا تدارک کریں۔
- ❖ برسات کے موسم میں کئی دفعہ پودوں کے تنوں سے گوند نکالنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو کسی تیز دھار آلہ سے اتار کر زخموں پر بورڈوپیسٹ لگائیں۔
- ❖ بیٹھے کا پھل برداشت کرنے کے بعد پوریا، ڈی اے پی اور پوناش ایک ایک کلوگرام فی پودا ڈالیں۔

کیڑے اور بیماریوں کے حملہ کی شدت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ان اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے فصل کی خصوصی نگہداشت کریں، فصل کا باقاعدگی سے معائنہ کریں اور موسمی پیشین گوئی سے باخبر رہیں۔ فصل کی تحفظ نباتات کا خاص خیال رکھیں۔

زہروں کا محفوظ استعمال

فصل پر سفارش کردہ محفوظ زہریں استعمال کریں، زہر کے استعمال اور فصل کی برداشت کے درمیان ضروری وقفہ یعنی PHI (Pre Harvest Interval) کو لازمی مد نظر رکھیں۔ زہر کا انتخاب کرتے وقت جنس میں زرعی زہروں کی باقیات کی قابل قبول زیادہ سے زیادہ حد یعنی MRL (Maximum Residual Limit) کو ہر صورت دیکھیں تاکہ اس کے استعمال سے جنس میں زہر کی باقیات حد سے زیادہ موجود نہ رہیں اور برآمد کرنے کی صورت میں بین الاقوامی منڈی میں جنس روکنے والا ورملکی چاول کی ساکھ متاثر نہ ہو۔

مونگ/ماش

- ❖ مونگ/ماش کی اچھی پیداوار کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی نہایت ضروری ہے۔ لہذا ان کو بروقت تلف کریں۔
- ❖ مونگ/ماش کی فصل کو 3 پانی درکار ہوتے ہیں۔ پہلا پانی اگاؤ کے تین ہفتے بعد، دوسرا پھول نکلنے پر اور تیسرا پھلیاں بننے پر دیں۔ اگر اس دوران بارش ہو جائے تو آبپاشی حسب ضرورت کریں۔ زیادہ بارش کی صورت میں زائد پانی کے نکاس کا مناسب بندوبست کریں۔
- ❖ مونگ/ماش کی بیماریوں اور کیڑوں کوڑوں کا تدارک محکمہ زراعت توسیع/پیٹ وارتنگ کے مقامی عملہ کے مشورہ سے کریں۔

سبزیات

- ❖ ٹماٹر اور گوبھی کی پیری کی کاشت جاری رکھیں۔
- ❖ ٹماٹر کی منظور شدہ اقسام روما، گلیڈ، پاکٹ نقیب، نادور اور سالار کاشت کریں۔
- ❖ کاشت سبزیات کی آبپاشی موسمی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کریں۔ بارش کے فالتو پانی کے نکاس کا انتظام کریں۔
- ❖ مولیٰ کی اگیتی اقسام دیسی، شاؤمائی، 40 دن والی، منو اور لال پری کی کاشت جاری رکھیں۔
- ❖ شلجم کی اقسام پریل ٹاپ، گولڈن بال، دیسی سرخ وغیرہ کی کاشت شروع کریں۔
- ❖ ٹنل برائے سبزیات میں کاشتہ جنمتر براہ سبز کھاد، جب پھولوں پر آنے لگے تو بذریعہ روتھ وائیٹر زمین میں ملا دیں، آدھی بوری پوریا ڈال کر پانی لگادیں اور ورتز آنے پر پریل چلا دیں۔