


ہیں۔ لہذا ان کی مناسبت سے جڑی بوٹی مارزہر کا انتخاب کریں۔ پہلے پانی کے بعد چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کے لئے سفارش کردہ زہر استعمال کریں۔ دوسرے پانی کے بعد نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کے لئے سپرے کی جائے۔ دونوں قسم کی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے والی زہر میں بھی میسر ہیں جو تقریباً 40 تا 45 دن کی فصل پر کی جاسکتی ہیں۔ گندم کی فصل میں پائی جانے والی چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے پہلی آپاشی کے بعد وتر حالت میں مخصوص زہر میں سفارش کردہ مقدار میں 100 تا 120 لٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ جڑی بوٹی مارزہروں کے سپرے کے لیے ٹی جیٹ یا فلیٹ فین نوزل استعمال کریں۔ سپرے کے بعد گوڈی یا بارہیر استعمال نہ کریں۔ جڑی بوٹی مارزہروں کے سپرے کے لیے دوپہر کا وقت زیادہ موزوں ہے۔ تیز ہوا، دھند یا بارش کی صورت میں ہرگز سپرے نہ کریں۔ سپرے کے دوران کسی جگہ پر دو بار سپرے نہ کریں اور نہ ہی کھیت کی کوئی جگہ خالی رہنے دیں۔ سپرے کے بعد جڑی بوٹیوں کو چارہ کے طور پر ہرگز استعمال نہ کریں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لئے مندرجہ ذیل جڑی بوٹی مارزہر میں محکمہ زراعت (توسیع) یا پیسٹ وارنگ کے عملہ کے مشورہ سے استعمال کریں۔

چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والی جڑی بوٹی مارزہر میں

نمبر شمار	اصل زہر	مقدار فی ایکڑ
1.	ٹرائی سلفوران WG75%	16 گرام
2.	بروموکسنل + ایم سی پی اے 60 EC	300 ملی لٹر
3.	فلوراکسی پائیر + ایم سی پی اے 50EC	375 ملی لٹر
4.	فلوراسولم + امانتوپائیر الڈ WG45	12.5 گرام



گندم

کھادوں کا استعمال

❖ بقیہ نائٹروجنی کھاد دوسرے پانی کے ساتھ مکمل کریں

آپاشی

❖ گندم کی فصل کو مناسب وقت پر آپاشی نہایت ضروری ہے۔ مناسب وقت پر آپاشی فصل کے اگا کو بہتر بناتی ہے، جڑوں کو مضبوط بناتی ہے شگوفے زیادہ بنتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اگر گندم کی فصل کو نازک اوقات مثلاً شگوفے بنتے وقت، پھول نکلتے وقت اور دانے کی دودھیہا حالت پر کمی آجائے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے۔

❖ کپاس، بکئی اور کماد کے بعد کاشتہ گندم کو دوسرا پانی بوائی کے 80 تا 90 دن بعد لگائیں۔

❖ دھان کے بعد کاشتہ گندم کو دوسرا پانی بوائی کے 80 تا 90 دن بعد لگائیں۔

❖ چکھیتی کاشتہ فصل کو دوسرا پانی بوائی کے 70 تا 80 دن بعد لگائیں۔

❖ تھل کے علاقہ جات میں دوسرا پانی 40 تا 45 دن بعد اور تیسرا پانی 70 تا 75 دن بعد لگائیں۔

جڑی بوٹیوں کی تلفی

گندم کی فصل میں چوڑے پتے والی اور نوکیلے پتے والی یعنی گھاس نما جڑی بوٹیاں آگتی

زراعت نامہ

500 ملی لیٹر	ٹراکاسڈیم + فینا کساپراپ پی اسٹھائل + کلوڈینا فاپ پراپر جائل 14.5% EC	.5
300 ملی لیٹر	کلوڈینا فاپ + فلوکاربازون سوڈیم 13.5 OD	.6
13.6 گرام	سلفوسلفیوران 75% WG	.7

نوٹ: یہ زہریں بجائی کے چالیس دن بعد یا دوسرا پانی لگنے کے بعد نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں اُگ آنے پر سپرے کریں۔

نوکیلے اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والی جڑی بوٹی مارزہریں

مقدار فی ایکڑ	اصل زہر	نمبر شمار
100 گرام	میزوسلفیوران میتھائل + آئیڈوسلفیوران 6% WG	.1
150 ملی لیٹر	پائراکسولم 45 OD	.2
600 ملی گرام	آکسو پروٹران + بینسلفیوران 70 WP	.3
120 ملی لیٹر	میزوسلفیوران میتھائل + فلووراسولم + فلوراکسی پائراکسی 26% OD	.4
400 ملی لیٹر	میزوسلفیوران میتھائل + فلووراسولم + ایم سی پی اے 25 OD	.5
600 گرام	ڈائلوفینی کان + آکسو پرائیورن 60% WP	.6
320 گرام	میزوسلفیوران میتھائل + ایم سی پی اے + سلفوسلفیوران WP 28.25%	.7
150 گرام	سلفوسلفیوران + میزوسلفیوران میتھائل 10.5% WDG	.8

14 گرام	میٹ سلفوران میتھائل + ٹرائی مینوران میتھائل 28.6 WDG	.5
400 گرام	فلوراکسی پائراکسی میتھائل + ٹرائی مینوران میتھائل 20 WP	.6
400 ملی لیٹر	فلوراکسی پائراکسی + فلوراسولم + ایم سی پی اے آکسو اوکٹائل 48% SC	.7
150 گرام	کلور پائراکسی + فلوراکسی پائراکسی + ٹرائی مینوران میتھائل 66% WDG	.8
24 گرام	ٹرائی مینوران میتھائل + فلوراسولم 75% WG	.9
300 ملی لیٹر	کلور پائراکسی + فلوراکسی پائراکسی + ایم سی پی اے 56% EC	.10
300 ملی لیٹر	فلوراکسی پائراکسی + روموکسنل + ایم سی پی اے آکسو اوکٹائل 52% SC	.11
200 ملی لیٹر	فلوراسولم + کارفینٹازون اسٹھائل + فلوراکسی پائراکسی 21% SE	.12

نوٹ: پہلے پانی کے بعد تر حالت میں جب چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں دو تین پتے کی حالت میں ہوں تب سپرے کریں۔

نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والی جڑی بوٹی مارزہریں

مقدار فی ایکڑ	اصل زہر	نمبر شمار
120 گرام	کلوڈینا فاپ پراپر جائل 15 WP	.1
120 ملی لیٹر	کلوڈینا فاپ پراپر جائل 20 EC	.2
500 ملی لیٹر	فینا کساپراپ پی اسٹھائل 7.5 EW	.3
330 ملی لیٹر	پناکساڈین 50 EC	.4

زراعت نامہ

سورج مکھی

- ❖ بھاری میرا زمین سورج مکھی کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ سیم زدہ، کلراٹھی اور بہت ریتیلی زمین اس کے لیے موزوں نہیں ہے۔
- ❖ ہائیرڈ اقسام عام اقسام کی نسبت زیادہ پیداوار دیتی ہیں اس لیے اچھی شہرت کی حامل کمپنیوں کے ہائیرڈ بیج اپنے علاقے کی مناسبت سے کاشت کریں۔
- ❖ سورج مکھی کی سفارش کردہ اقسام ایگوارا 4، این کے آرمنی، یوالیس 666، پارسن 3، آگسن 5270، ان کے ایس 278، اوریسن 648، اوریسن 516، اوریسن 675، اوریسن 701، اوریسن 741، اوریسن 751، نارک سن، آر جی ٹی وولف اور رائینا کاشت کریں۔
- ❖ جنوبی اور وسطی پنجاب کے اضلاع میں 31 جنوری تک اور شمالی پنجاب کے اضلاع میں 15 فروری تک کاشت مکمل کریں۔
- ❖ سورج مکھی کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے فصل کو قطاروں میں کاشت کریں۔ قطاروں کا درمیانی فاصلہ اڑھائی فٹ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 9 انچ رکھیں۔
- ❖ اچھے اگاؤ والے صاف ستھرے دوغلی (ہائیرڈ) اقسام کے بیج کی فی ایکڑ مقدار 2 کلوگرام رکھیں۔
- ❖ فصل کو زمین میں موجود اور بیج کے اندر پائی جانے والی فنجائی سے لگنے والی بیماریوں سے بچانے کے لیے بوائی سے پہلے مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک پھپھوندی کش / کرم کش زہر لگائیں۔

نوٹ: یہ زہریں پہلے پانی کے بعد جب فصل کم وتر حالت میں ہو، تب سپرے کریں اور دوہرا سپرے کرنے سے اجتناب کریں نیز ریتیلی کلراٹھی زمینوں پر یہ سپرے ہرگز نہ کریں۔

سلائی سٹی اور تمام اقسام کی جڑی بوٹیوں کے لیے جڑی بوٹی مارزہریں

نمبر شمار	اصل زہر	مقدار فی ایکڑ
1	سائپر فلوآن + آئیسوپروٹیوران 25 OD	1100 ملی لیٹر

نوٹ: یہ زہر پہلے پانی کے بعد تر وتر کی حالت میں سپرے کریں اور دوہرا سپرے کرنے سے اجتناب کریں۔

کپاس

- ❖ گلابی سنڈی کپاس کے بیجوں میں یا جنگ فیکٹریوں میں موجود کچرے میں یا کھیتوں کے کنارے پڑی کپاس کی چھڑیوں کے ساتھ ان کھلے ٹینڈوں میں موجود ہوتی ہیں ان کو ہر صورت تلف کریں۔
- ❖ گلابی سنڈی کی تلفی کے لیے کپاس کے کھیتوں میں مٹی پلٹنے والا اصل چلا کر متاثرہ ٹینڈوں کو تلف کریں۔

چنا

- ❖ چنے کی فصل میں جڑی بوٹیوں کی تلفی جاری رکھیں۔
- ❖ چنے کی فصل کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے۔ حسب ضرورت پھول آنے پر پانی لگائیں۔
- ❖ آبپاش علاقوں میں اگر کثرت کھاد، اگیتی کاشت یا بارش کی وجہ سے فصل کا قد بڑھ رہا ہو تو مناسب حد تک سوکادیں یا کاشت کے دو ماہ بعد شاخ تراشی کریں۔

زراعت نامہ

باغات (آم)

- ❖ کورے سے بچاؤ کی تدابیر جاری رکھیں۔
- ❖ نئے باغات لگانے کے لیے گڑھے کھودیں۔
- ❖ گدھی کے خلاف کنٹرول جاری رکھیں۔
- ❖ آبپاشی کے لیے بند اور کھالے بنائیں۔
- ❖ کیڑوں اور پھپھوندی کش زہروں کا انتظام کریں۔
- ❖ نئے باغات لگانے کے لیے اعلیٰ قسم کے پودوں کا انتظام کریں۔
- ❖ زمین کا تجزیہ کروائیں اور کھادوں کی مقدار کا تعین کریں۔

ترشاوہ پھل

- ❖ بیمار، سوکھی اور غیر ضروری شاخوں کی کانٹ چھانٹ کریں۔
- ❖ کنوں، چائے لیموں اور دیگر اقسام کی برداشت جاری رکھیں۔
- ❖ نئے باغات لگانے کے لیے زمین کی تیاری کریں اور 3x3x3 کے گڑھے کھودیں اور 15 دن کے لئے کھلے رکھیں۔
- ❖ گڑھوں میں ایک فٹ اوپر والی گڑھے کی مٹی ایک حصہ بھل اور ایک حصہ گلی سڑی گوبر کی کھاد ملا کر بھریں بعد میں پانی لگا کر جگہ ہموار کریں۔
- ❖ تسلی بخش پودے خریدنے کے لیے اچھی زسری کا انتخاب کریں۔
- ❖ اس پندرہواڑے میں فاسفورس، پوٹاش والی اور اجزائے صغیرہ والی کھادیں ڈال سکتے ہیں۔
- ❖ کھاڈ ڈالنے کے بعد آبپاشی ناگریز ہے۔

نمبر شمار	زہر کا نام	مقدار زہر	پانی کی مقدار
1.	مینی نوکسم 37.5 گرام/لٹر + فلوڈی اوکسائل 12.5 گرام/لٹر + ایزو کسی اسٹرو بین 75 گرام/لٹر	3 ملی لٹر فی کلوگرام بیج	25 ملی لٹر پانی
2.	امیڈاکلوپرڈ 360 گرام/لٹر + ٹیپو کونازول 12.5 گرام/لٹر	10 ملی لٹر فی کلوگرام بیج	25 ملی لٹر پانی
3.	تھایا میتھاکسم 22.4% + فلوڈی اوکسائل 0.8% + ڈائی فینا کونازول 0.8%	4 ملی لٹر فی کلوگرام بیج	30 ملی لٹر پانی

بوائی کے وقت کمزور زمین میں پونے دو بوری ڈی اے پی + ایک بوری ایس او پی اور اوسط زرخیز زمین میں ڈیٹھ بوری ڈی اے پی اور ایک بوری ایس او پی فی ایکڑ استعمال کریں۔

بہاریہ مکی

- ❖ میرا بھاری اور گہری زرخیز زمین جس میں نامیاتی مادہ کی مقدار بہتر ہو اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت اچھی ہو۔ مکی کی کاشت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ریتیلی، سیم زدہ اور کلر اٹھی زمین اسکی کاشت کے موزوں نہیں۔
- ❖ شرح بیج 8 تا 10 کلو بیج فی ایکڑ رکھیں
- ❖ بیج کو پھپھوندی کش/حشرات کن زہر لگا کر کاشت کریں۔
- ❖ مکی کی کاشت 15 جنوری سے 15 فروری تک مکمل کریں۔
- ❖ فصل کے اچھے اگاؤ اور بڑھوتری کے لیے کھیت کا اچھا تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر زمین میں سخت تہہ موجود ہو تو اسے توڑنے کے لیے گہراہل چلائیں۔