



2920-28

No. /DGA(PW&QCP)

Dated: 02-06-2026

**DIRECTORATE GENERAL
(PEST WARNING & QUALITY CONTROL OF PESTICIDES)
AGRICULTURE HOUSE, 21 – DAVIS ROAD, LAHORE.**

Phone: 042 – 99204371, Email: dgapestwarninglahore@gmail.com

نظم اعلیٰ
(پست وارننگ و کوالٹی کنٹرول
آف ڈی مائیگنڈز) پنجاب لاہور

- Additional Director Generals Agri. (PW&QCP) Central, Rice & South Zones
- Directors Agri. (PP) Multan, Bahawalpur, D.G.Khan, Sahiwal, Faisalabad and Sargodha Divisions

Subject: **PEST ALERT OF COTTON SUCKING PESTS (JASSID, WHITEFLY, THRIPS)**

Needless to mention that surveys conducted by Pest Warning teams during the last three days have revealed an upward trend in the infestation of major cotton sucking pests including Whitefly above ETL 1.1% & below ETL 53.6%, Jassid above ETL 1.7% & below ETL 43.8% whereas Thrips above ETL 1.9% and below ETL 60.9%.

The prevailing hot and dry weather conditions are highly conducive to the rapid multiplication and spread of these pests. The increasing percentage of spots under the Below Economic Threshold Level (BETL) category indicates a potential risk of escalation into Above Economic Threshold Level (AETL) if timely preventive measures are not undertaken.

In view of the above, all field formations are hereby directed to remain highly vigilant and ensure maximum outreach to cotton growers through field visits, conduct pest scouting, awareness campaigns, and farmer advisory services. The advisory for integrated pest management of the sucking pests is attached herewith for further dissemination.

Amir Rasool
Director General 02-06-2026

- PS to Secretary Agriculture, Government of Punjab, Lahore.
- Director General Agriculture (Ext.) Punjab, Lahore with the request to sensitize field formation for its awareness to the farming community and timely control.
- Director General Agricultural Information, Punjab, Lahore with the request to ensure maximum dissemination through social media.

کپاس کے ضرور سائ کیزوں کے تدارک کیلئے سفارشات

رس چوسنے والی کیزے (تھرپس، سفید کھی، چست تیلہ)

- ہفتے میں کم از کم دو مرتبہ پیسٹ سکاؤٹنگ ضرور کریں۔
- کپاس کی فصل کے کھیت اور اسکے ارد گرد جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کریں۔
- فصل کو پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ گرم اور خشک حالات میں تھرپس اور سفید کھی کا حملہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ لہذا بوقت ضرورت ہلکی آبپاشی کریں۔
- متبادل میزبان فصلات جیسے بیگن، کھیرا، کدو، حلوہ کدو، ٹماٹر، مرچ، بھنڈی، مونگ وغیرہ پر باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ کریں تاکہ ان متبادل خوراک کی پودوں پر رس چوسنے والے ضرور سائ کیزوں کو بروقت کنٹرول کیا جاسکے۔
- 15-20 پیلے چکنے والے کارڈ فی ایکڑ لگائیں اور 15 دن کے وقفے کے بعد چکنے والا گلو دوبارہ لگائیں۔
- ابتدائی مراحل میں دوست کیزے اور حیاتیاتی مرکبات (Bio-Extracts) مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
- محکمہ زراعت کی بائیولوجیکل لیبارٹریز سے دستیاب بائیو کارڈ کرائی سوپرلا کے کارڈ بحساب 20 فی ایکڑ لگائیں۔
- ایک ہی کیمسٹری کی زرعی زہروں کے بار بار استعمال سے گریز کریں۔
- اگر تھرپس کا حملہ معاشی نقصان کی حد 10۴8 بالغ یا بچے فی پے ملا کر ہو جائے تو درج ذیل میں سے کسی ایک سفارش کردہ زہر کا انتخاب کریں۔

سیریل نمبر	زرعی زہر	مقدار فی ایکڑ
1	اسپنٹورام 120 ایس سی	60 لیٹر
2	کلور فینا پاز 360 ایس سی	75 لیٹر
3	آکسوسائیگلو سیرم 100 ڈی سی	280 لیٹر
4	ایپامیکشن + تھاپا میتھاکسم 108 ایس سی	400 لیٹر
5	فلوئیکا میڈ + سپائینوسید 53 فیصد ڈیلیوڈی جی	75 گرام

سفید کھی کا حملہ نقصان کی معاشی حد 5 بالغ یا بچے یا دونوں ملا کر فی پے ہو جائے تو درج ذیل میں سے کسی ایک سفارش کردہ زہر کا انتخاب کریں۔

سیریل نمبر	زرعی زہر کا نام	مقدار فی ایکڑ
1	پائیری پروکسی فین 10.8 ای سی (آئی جی آر)	لیٹر 500
2	سپائر وٹیرامیٹ 240 ایس سی + بائیو پاور (آئی جی آر)	250 + 125 لیٹر
3	پرو فٹیرین 25 ڈیلیوڈی (آئی جی آر)	600 گرام
4	پائیری فلو کوئینازون 20 فیصد ڈیلیوڈی جی	200 گرام
5	افیز وپائیر وپن 5 فیصد ڈی سی	300 لیٹر
6	سپائر وٹیرامیٹ + امینا سپرڈ 54 فیصد ڈیلیوڈی جی	200 گرام
7	فلوئیکا میڈ + سپائر وٹیرامیٹ 18 ڈیلیوڈی	200 گرام
8	ڈائی نوٹیفیوران + سپائر وٹیرامیٹ 20 فیصد ایس سی	250 لیٹر
9	فلوئیکا میڈ 50 فیصد ڈیلیوڈی جی	80 گرام
10	ایپامیکشن + فلوئیکا میڈ 15.6 فیصد ڈیلیوڈی جی	150 گرام

چست تیلے کا حملہ نقصان کی معاشی حد ایک بالغ و بچے فی پے تک ہو تو درج ذیل میں سے کسی ایک سفارش کردہ زہر کا انتخاب کریں۔

سیریل نمبر	زرعی زہر	مقدار فی ایکڑ
1	پائی میٹرو زین + ڈائی نوٹیفیوران 60 فیصد ڈیلیوڈی جی	100 گرام
2	فلو پائیڈ فیوریوران 200 ایس سی	300 لیٹر
3	فلوئیکا میڈ 50 ڈیلیوڈی جی	60 + 80 گرام
4	ڈائی نوٹیفیوران 20 ایس سی	100 گرام
5	ایپامیکشن + تھاپا میتھاکسم 108 ایس سی	300 لیٹر

Am.

6	نامن پائرام 10 فیصد اے ایس	200 ملی لیٹر
7	سلفا کسٹور 240 ایس سی	50 ملی لیٹر
8	ایسیفیت 75 ایس پی	250 تا 300 گرام
9	ڈائل میتھوایت 40 ای سی	400 ملی لیٹر
10	کلور فینا پائرام 360 ایس سی	100 ملی لیٹر

گلابی سنڈی (Pink Bollworm)

- گلابی سنڈی کے حملے کا بروقت پتہ لگانے کے لئے ہفتے میں دو بار کپاس کی فصل کی پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔
- مانیٹرنگ کے لئے گلابی سنڈی کے جنسی پھندے 1 تا 2 فی ایکڑ اور کنٹرول کے لئے 9 تا 12 پھندے فی ایکڑ لگائیں اور ہر 15 دن کے وقفے سے فیرومون کیپسول کو تبدیل کریں یا لمبے عرصے والے فیرومون استعمال کریں۔
- گلابی سنڈی کے حملے کے شروع میں ٹرائیکلوگراما کارڈ 20 فی ایکڑ لگائیں جو محکمہ زراعت کی بائیولوجیکل لیبارٹریز سے مفت دستیاب ہیں ہر 15 دن کے بعد کارڈ دوبارہ لگائیں۔

جاری کردہ: ڈائریکٹوریٹ جنرل زراعت پیسٹ وارنگ و (توسیع) پنجاب لاہور، ڈائریکٹوریٹ کاشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان

Amir Rasul
 Director General
 Agriculture (PW & QCP)
 Punjab, Lahore.
 01-06-2020