



- NPK کے مناسب استعمال سے کیڑے اور بیماریوں کے خلاف فصل کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
- نقصان دہ کیڑوں کی روک تھام اور کسان دوست کیڑوں کی افزائش میں معاونت کیلئے ہفتے میں دو بار معائنہ/پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔
- مائع کیڑے مار زہروں کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کریں۔ کیونکہ اس سے کسان دوست کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔
- ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اور بیماریوں کے مؤثر کنٹرول کے لئے فصل میں گوبھ سے لیکر دانہ بننے تک پانی کو موکھنے نہ دیں۔
- افلاٹاکسن سے بچاؤ کے لیے کھانسی کے دوران مشینری صاف رکھیں اور فصل کو فوری طور پر مناسب نمی تک خشک کریں۔
- ذخیرہ کے دوران اجناس کو خشک، خشک اور ہوا دار جگہ پر رکھیں اور نمی والے ماحول سے اجتناب کریں۔

خبردار! چاول کی فصل پر زہری زہروں کی باقیات کی وجہ سے درج ذیل زہریں سپرے کرنا ممنوع ہیں



امیڈا کلوپرڈ	کاربینڈازم	پروفینوفاس
چرو فینون	ٹیوبو کونازول	ٹرائی سائیٹھائزول
ایسٹامپھروڈ	کلورپائری فاس	ہیڈروکونازول
ٹرائی ایزوفاس	تھائیوفینیت میتھائل	فلوٹریا فال
تھائیامیتھائزول	کلوٹھیامیڈون	



- زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر کے پتوں کے بھورے دھبوں اور بلاسٹ کے حملے کو محدود کیا جاسکتا ہے۔
- دانے دار زہر کو پیسٹ سکاؤٹنگ کے بعد نقصان کی معاشی حد کو نظر رکھتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ انچ کھڑے پانی میں پہلی دفعہ (35-40) دن اور دوسری دفعہ گوبھ کی حالت میں استعمال کریں۔
- تنے کی سنڈیوں کے حیاتیاتی کنٹرول کے لیے ٹرائیکوگراما کارڈز کا استعمال کریں۔
- ایسی زرعی زہریں جو محکمہ زراعت کی طرف سے دھان کی فصل پر اسپرے کیلئے رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کا ہرگز استعمال نہ کریں۔
- ابتدا میں ساری فصل پر اسپرے کرنے کی بجائے صرف متاثرہ حصوں پر ہی اسپرے کریں۔
- دھان کی سفید پستی و بھورے تیلے کی ابتدائی حملہ کی صورت میں فصل کو 3 سے 4 دن کا سوکا دیا جائے۔
- ہمیشہ سفارش کردہ زہریل پر درج ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔
- زہر کے استعمال کے دوران وقفہ قبل از برداشت (PHI) کو مد نظر رکھیں۔
- فائلس سٹ کے جرثومے متاثرہ مونجروں، آلودہ بیج اور فصل کی باقیات میں زندہ رہ کر اگلی فصل میں منتقل ہو سکتے ہیں، لہذا برداشت کے فوراً بعد ان کی تلفی یقینی بنائیں۔



زہری زہروں کی باقیات سے پاک دھان کی کاشت

دھان پاکستان کی ایک اہم نقد آور فصل ہے جو ملکی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ زرمبادلہ کمانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صوبہ پنجاب کے روایتی علاقہ میں پیدا ہونے والا چاول دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں یہ فصل 67 لاکھ ایکڑ پر کاشت ہو رہی ہے۔ پاکستان دنیا کا چوتھا چاول برآمد کرنے والا ملک ہے۔ پاکستان نے سال 2024-25 میں 5.8 ملین ٹن چاول برآمد کر کے تقریباً 3.36 ارب ڈالر زرمبادلہ کا حصول کیا ہے۔

چاول درآمد کرنے والے ممالک کے زرعی زہروں کی باقیات (MRLs) اور افلاٹاکسن کے حوالے سے معیار بہت سخت ہیں جس کی وجہ سے برآمدات کو خطرات لاحق رہتے ہیں برآمدی معیار کے چاول کی پیداوار کے حصول کے لیے محکمہ زراعت پنجاب مقرر پورم چلا رہا ہے جس کے خاطر خواہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔

دھان کی فصل کے لئے مربوط طریقہ انسداد

قبل از کاشت

- دھان کی پیری 20 مئی سے پہلے ہرگز کاشت نہ کریں۔
- غیر منظور شدہ اقسام کاشت کرنے سے اجتناب کریں۔
- بیج کو پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔
- کسان حضرات بکائی سے متاثرہ کھیت سے بیج حاصل نہ کریں تاکہ بیماری اگلی فصل میں منتقل نہ ہو

لاپ کی منتقلی کے بعد

- صحت مند بیجی مختلف بیماریوں اور کیڑوں سے تحفظ کی ضامن ہے۔
- کھیتوں اور ان کے اطراف میں اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو تلف کریں۔
- بکائی سے متاثرہ پودوں کو اکھاڑ کر تلف کریں۔

زرعی زہروں کی باقیات سے پاک



دھان کی کاشت



حکومت پنجاب
محکمہ زراعت

دھان کی پیاریوں کے خلاف استعمال ہونے والے سفارش کردہ زرعی زہریں

زرعی زہر کا نام	بیماری کا نام	مقدار فی ایکڑ	دھان کی کاشت
ڈائی فیتو کوٹازول 250 ای سی	بھبھکا	125 لی لیٹر	14
ڈیٹھ لائسنس + ڈائی فیتو کوٹازول 12 ڈی بی پی	بھبھکا	250 گرام	35+14
سلفٹر 80 فیصد ڈی بی پی	جراثیمی جھلاؤ، بھبھکا، بھورسے دھبے	800 گرام	7
ایز ڈی سی سٹروین + ڈائی فیتو کوٹازول 30 فیصد ای سی	بھبھکا، بھورسے دھبے، ملائی جھلاؤ، فاس سٹ	200 لی لیٹر	14
فلو آکسائیڈین 48 فیصد ای سی	کھورسے دھبے، ملائی جھلاؤ	125-100 لی لیٹر	28
ڈائی فیتو کوٹازول + پروپی کوٹازول 300 ای سی	بھورسے دھبے	120 لی لیٹر	45+30
چیکو سی اسٹروین + سائیڈو کوٹازول 280 ای سی	بھورسے دھبے	240 لی لیٹر	45+30
ایز ڈی سی سٹروین + پروفیکوٹازول 24 فیصد ای سی	ملائی جھلاؤ	250+200 لی لیٹر	35
ڈائی لائسنس + ای سی کوٹازول 24 فیصد ای سی	جراثیمی جھلاؤ	100 لی لیٹر	15
ڈائی لائسنس 5 فیصد ای سی	جراثیمی جھلاؤ	300 لی لیٹر	11
کسو گائسن 2 فیصد ای سی	جراثیمی جھلاؤ، ملائی جھلاؤ، بھبھکا	600 لی لیٹر	14
فلو پائیرم + ڈائی فیتو کوٹازول 500 ای سی	ملائی جھلاؤ، بھبھکا	240-200 لی لیٹر	32
کاپر آکسی کلورائیڈ 50 فیصد ڈی بی پی	جراثیمی جھلاؤ، فاس سٹ	500 گرام	14
کاپر آکسی کلورائیڈ + کسو گائسن 47 فیصد ڈی بی پی	جراثیمی جھلاؤ	400-240 گرام	14
کاپر ہائیڈرو آکسائیڈ 77 فیصد ڈی بی پی	جراثیمی جھلاؤ	250-200 گرام	14
چیکو سی اسٹروین + پروپی کوٹازول 30 فیصد ای سی	فاس سٹ	204-228 لی لیٹر	21

دھان کے کیڑوں کے خلاف استعمال ہونے والے سفارش کردہ زرعی زہریں

زرعی زہر کا نام	کیڑے کا نام	مقدار فی ایکڑ	دھان کی کاشت
ہائی فلیٹریٹین 10 فیصد ای سی	ٹوکا	250 لی لیٹر	30
فلو میڈاٹائیڈ 48 فیصد ای سی	سجے کی مٹی	75 لی لیٹر	7
مونو می ہائیڈ 5 فیصد جی	سجے کی مٹی	7 گرام	14
کاربپ 4 فیصد جی	سجے کی مٹی، پھپھٹ مٹی	60 گرام	40
آکسولپٹو سیرم 200 ای سی	سجے کی مٹی	120 لی لیٹر	29
	پھپھٹ مٹی	40 لی لیٹر	
ٹیٹرا مٹی پرول 200 فیصد ای سی	سجے کی مٹی، پھپھٹ مٹی	100 لی لیٹر	33
ایما ٹیکٹن ہائیڈرائٹ + ٹیٹرا مٹی پرول	سجے کی مٹی، پھپھٹ مٹی	100 گرام	16
کھورسے دھبے پرول + ایما ٹیکٹن ہائیڈرائٹ	سجے کی مٹی، پھپھٹ مٹی	8 گرام	14
ایما ٹیکٹن ہائیڈرائٹ + ایٹو کسارپ	پھپھٹ مٹی	120+60 لی لیٹر	28
سیمی مائی ہائیڈرائٹ 60 ای سی	پھپھٹ مٹی	75 لی لیٹر	21
کھورسے دھبے پرول 0.4 فیصد جی	سجے کی مٹی	4 گرام	14
فلو لٹاٹائیڈ 50 فیصد ڈی بی پی	سجے کی مٹی، بھورسے دھبے	60 گرام	7
ٹائین پائرم + پائی ٹیٹروڈین 60 فیصد ڈی بی پی	سجے کی مٹی، بھورسے دھبے	100 گرام	14
ڈائی فیتو کوٹازول + پائی ٹیٹروڈین 60 فیصد ڈی بی پی	سجے کی مٹی، بھورسے دھبے	100 گرام	14
ٹرائی فلو میڈو پیرم 10 فیصد ای سی	سجے کی مٹی، بھورسے دھبے	94 لی لیٹر	21
پائی ٹیٹروڈین 350 ڈی بی پی	سجے کی مٹی، بھورسے دھبے	60 گرام	14

ڈائریکٹوریٹ جنرل

پیٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائیڈز پنجاب لاہور

042-99204371