



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

65

پندرہ روزہ
زراعت نامہ
لاہور

15 اکتوبر 2026ء، 03 جمادی الاول 1448 ہجری، یکم کاتک 2083

65 Years of Continuous Publication

16 October 2026

World Food Day

Innovate
today. Nourish
tomorrow.

Scan for Website



Scan for YouTube



نظامت اعلیٰ زرعی اطلاعات
21- سر آغا خان سوئم روڈ لاہور
محکمہ زراعت حکومت پنجاب



Scan for Facebook



Scan for Tik Tok





مریم نواز کا خواب --- سونا اگلتا پنجاب



PUNJAB SEED CORPORATION

خوشحالی کا ضامن



گندم کا بیج

زیادہ پیداوار • بہتر معیار • خوشحال کسان



مقررہ قیمت

Rs. 7,000/-

فی 50 کلوگرام تھیلا

پنجاب سیڈ کارپوریشن کے مارکیٹنگ
سنٹرز کے رابطہ نمبرز

0314- 6467892

• وہاڑی

صرف وائس ایپ (بیڈ آفس)

0325-4111111

0303-9976121

• خانیوال

0304-4440342

• فتح جنگ

0309-7608437

• فیصل آباد

• گوجرانوالہ 0302-3300499

0300- 4572727

• سرگودھا

0345-8272967

• لاہور

0300-0630087

• ساہیوال

0309 -7608437

• جھنگ

• لیہ / بھکر 0300-3407050

0332 -6833936

• ڈیرہ غازی خان

0300-4358989

• ملتان

0300-8353810

• رحیم یار خان

03216339276

• بہاولپور

• بہاولنگر 0301-5555947

نظامت اعلیٰ زرعی اطلاعات پنجاب



SCAN FOR WEBSITE

محکمہ زراعت، حکومت پنجاب

ایگر یکلچرل ہیلپ لائن 0800-17000 روزانہ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک



SCAN FOR FACEBOOK

65

نذاعت نامہ

پندرہ روزہ لاہور
15 اکتوبر 2026ء، 3 جمادی الاول 1448 ہجری، یکم کاتک 2083 بکری

65 Years of Continuous Publication

فہرست مضامین

05	اداریہ: عالمی یوم خوراک
06	آپاش علاقوں میں گندم کی کاشت
12	زمین میں موجود جرثوموں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں
14	سبزیوں اور پھلوں کی باقیات سے تیار کردہ بائیو چار کی مٹی کی بہتری کے لئے اہمیت
15	زرعی سفارشات
18	اکتوبر کیلنڈر 2026

شمارہ 20

جلد 65

مجلس ادارت

سرپرست اعلیٰ: شکیل احمد میاں سیکرٹری زراعت پنجاب

• مدیر اعلیٰ نوید عصمت کالہوں

• مدیر رائے مدر عباس

• معاون مدیر ریحان آفتاب

• آن لائن ایڈیشن محمد ریاض قریشی، محمد شہزاد

• گرافکس ابرار حسین

• کمپوزنگ کاشف ظہیر

• پروف ریڈنگ سعدیہ منیر

• فوٹو گرافی روبان نواز ش، عثمان افضل

Scan for Website



Scan for YouTube



Scan for Facebook



Scan for Tik Tok



نظامت اعلیٰ زرعی اطلاعات

21- سر آغا خان سوئم روڈ لاہور dgainformation@gmail.com

محکمہ زراعت حکومت پنجاب



میڈیا لائزنان یونٹ

ایگریکلچر کمپلیکس، شمس آباد، مری روڈ

راولپنڈی - فون: 051-9292165

میڈیا لائزنان یونٹ

ایگریکلچر فارم، اولڈ شجاع آباد روڈ

ملتان - فون: 061-9201187

ریسرچ انفارمیشن یونٹ

ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کیمپس، جھنگ روڈ

فیصل آباد - فون: 041-9201653

مشعلِ رات

انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ طور سینین کی۔ اور اس امن والے شہر کی۔ کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ پھر (رفتہ رفتہ) اس (کی حالت) کو (بدل کر) پست سے پست کر دیا۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے تو (اے آدم زاد) پر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ (التین: 1 تا 8)

ارشادِ باری تعالیٰ

سیدنا ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال تازہ کھیتی کی مانند ہے کہ جس طرف سے ہوا آتی ہے اسے جھکا دیتی ہے اور ہوا کے نہ ہونے کے وقت سیدھی ہو جاتی ہے۔ بس مومن بلا سے اسی طرح بچار ہوتا ہے اور گنہگار کی مثال صنوبر کے پیڑ کی سی ہے کہ سیدھا سخت کھڑا رہتا ہے (تو) اللہ جب چاہتا ہے اسے اکھیڑ دیتا ہے۔ (کتاب المرضہ: مختصر صحیح بخاری: 1050)

نعتِ نبوی ﷺ

میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں کام کام اور بس کام۔ سکون کی خاطر، صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔

فَمَارِ قَائِدٌ

(آل انڈیا مسلم لیگ، سٹوڈنٹ کانفرنس جالندھ، 15 نومبر 1942ء)

مانند سحر صحنِ گلستان میں قدم رکھ
آئے تہ یا گوہرِ شبنم تو نہ ٹوٹے
ہو کوہ و بیاباں سے ہم آغوش و لیکن
ہاتھوں سے ترے دامنِ افلاک نہ چھوٹے !
(صبح: ضربِ کلیم)

قَمُورَةُ اِقْبَالِ

دنیا بھر کے 150 سے زائد ممالک میں ہر سال 16 اکتوبر کو عالمی یوم خوراک منایا جاتا ہے۔ دن منانے کا مقصد بھوک کے مسائل بارے شعور اُجاگر کرنا، خوراک، بنی نوع انسان اور کرہ ارض کے بہتر مستقبل کے لئے عملی اقدامات کی ترغیب دینا ہے۔ جدید اور انقلابی خیالات سے لے کر آزمودہ اختراعات تک حقیقی تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب نئے تصورات کو اپنایا جائے، مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالا جائے، ان کے لئے مالی وسائل کی فراہمی کا دائرہ کار وسیع کیا جائے۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت اس سال 16 اکتوبر کو "Innovate today, Nourish tomorrow" سلوگن کے تحت یوم خوراک منارہا ہے۔ یہ موضوع انسانی ذہانت، تخلیقی صلاحیتوں اور جدت سے بھرپور افکار کو بروئے کار لا کر موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نئی ٹیکنالوجیز اور طریقہ کار متعارف کرانے کے ساتھ علم و تجربات کا تبادلہ کیا جائے اور مؤثر جدت، مسلسل سرمایہ کاری اور باہمی اشتراک پر مبنی شراکت داری کے ذریعے کامیاب حل کو عملی صورت دی جائے۔ مسلح تنازعات، موسمیاتی شدت اور جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی صورت حال زرعی و غذائی نظام پر دباؤ میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں کھیتوں، منڈیوں اور غذائی مصنوعات کی تیاری کے مراکز سے پیدا ہونے والا نامیاتی فضلہ اکثر بغیر استعمال کے ضائع ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ خوراک و زراعت ایسے گردشی حیاتیاتی معیشت کے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جن کے ذریعے اس فضلے کو جانوروں کی خوراک، کھاد، توانائی اور دیگر مفید مصنوعات میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ خوراک کے ضیاع اور اسکے نقصان کی حد، نگرانی اور تجزیے کے لئے اقوام متحدہ کے تحت فوڈ لاس ایپ (FLAPP) اور آپٹی ویسٹ (Optiwaste) متعارف کرائی گئی۔ زرعی و غذائی نظام کو بہتر بنانے کے لئے درکار بہت سے طریقے اور وسائل پہلے ہی دستیاب ہیں۔ عالمی خوراک، زراعت اور غذائی تحفظ سے متعلق تازہ اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں دنیا بھر میں تقریباً 64 کروڑ 50 لاکھ افراد کو بھوک کا سامنا کرنا پڑا یعنی دنیا کا تقریباً ہر 13 واں فرد بھوک سے متاثر ہے اسی طرح تقریباً 2 ارب 69 کروڑ افراد کے پاس صحت بخش غذا خریدنے کی استطاعت نہیں تھی جبکہ دنیا بھر میں 6 سے 23 ماہ کی عمر کے تین میں ایک سے بھی کم بچے کو ایسی غذائیتی ہے جس میں غذائی تنوع کی کم از کم ضروری سطح موجود ہو۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فصل کی برداشت سے فروخت کے مرحلے تک رسد کے دوران تقریباً 13 فیصد خوراک ضائع ہو جاتی ہے اور دستیاب خوراک کا تقریباً 19 فیصد خوردہ فروشی، کھانے پینے کی خدمات فراہم کرنے والے کاروباروں اور گھریلو سطح پر ضائع ہو جاتا ہے۔ انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں زمین کی زرخیزی اور معیار میں آنے والی مجموعی تنزلی کا 60 فیصد سے زیادہ حصہ زرعی زمینوں پر مشتمل ہے۔ دنیا بھر میں میٹھے پانی کے مجموعی حصول کا تقریباً 72 فیصد حصہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے مجموعی اخراج کا تقریباً ایک تہائی حصہ زرعی و غذائی نظام سے بنتا ہے جبکہ دنیا بھر میں خشک سالی کے باعث ہونے والے مجموعی معاشی نقصانات کا تقریباً 80 فیصد بوجھ زرعی شعبہ برداشت کر رہا ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتیں، ادارے، مقامی برادریاں اور تنظیمیں خوراک کی پیداوار، استعمال اور قدر و اہمیت کے تعین میں اہم کردار ادا کریں۔



سفارش کردہ اقسام

(الف): برائے آبپاش علاقہ جات

نمبر شمار	قسم	ادارہ	سن اجراء	نمبر شمار	قسم	ادارہ	سن اجراء
1	سوریا-24	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2025	13	رہبر-21	نیلم سید کمپنی جہانیاں	2021
2	فلک-24	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2025	14	اکبر-19	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2019
3	چمپن-24	ایرڈزون ریسرچ انسٹیٹیوٹ، بھکر	2025	15	بھکر سٹار-19	ایرڈزون ریسرچ انسٹیٹیوٹ، بھکر	2019
4	عروج-22	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2022	16	غازی-19	علاقائی زرعی تحقیقاتی ادارہ بہاولپور	2019
5	نشان-21	ایرڈزون ریسرچ انسٹیٹیوٹ، بھکر	2021	17	فخر بھکر-17	ایرڈزون ریسرچ انسٹیٹیوٹ، بھکر	2017
6	دلکش-20	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2021	18	اناج-17	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2017
7	سجانی-21	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2021	19	اجالا-16	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2016
8	ایم ایچ-21	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2021	20	زنکول-16	این اے آر سی، اسلام آباد	2016
9	ڈیورم-2021	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2021	21	بور لاگ-16	این اے آر سی، اسلام آباد	2016
10	صادق-21	علاقائی زرعی تحقیقاتی ادارہ بہاولپور	2021	22	جوہر-16	علاقائی زرعی تحقیقاتی ادارہ بہاولپور	2016
11	نواب-21	علاقائی زرعی تحقیقاتی ادارہ بہاولپور	2021	23	فیصل آباد-2008	تحقیقاتی ادارہ برائے گندم، فیصل آباد	2008
12	این اے آر سی سپر	این اے آر سی، اسلام آباد	2021				

- عروج-22، فلک-24 اور سوریا-24 بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو نسبتاً زیادہ بہتر طور پر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
- صادق-21 اور نواب-21 جنوبی پنجاب میں کاشت کے لئے زیادہ موزوں ہیں۔
- ڈیورم-2021 گندم کی الگ نوعیت کی قسم ہے جو صنعتی استعمال یعنی پاستہ مصنوعات (نوڈلز وغیرہ) بنانے کے لئے موزوں ہے۔

اقسام سے متعلق ضروری ہدایات

- اکبر-19، نواب-21 اور زنکول-16 غذائیت کے اعتبار سے نسبتاً زنک کی زیادہ مقدار کی حامل اقسام ہیں۔
- عروج-22 و نشان-21 آبپاش و بارانی دونوں علاقہ جات کے لئے منظور شدہ ہے۔
- فیصل آباد-2008، پاکستان-13 اور بارانی-17 گنگی سے متاثر ہوتی ہیں لہذا ان کو کم رقبہ پر کاشت کیا جائے۔

گندم کا وقت کاشت

بہترین وقت کاشت یکم نومبر تا 20 نومبر ہے تاہم 30 نومبر تک گندم کی کاشت کی جاسکتی ہے۔ اگر کچھیتی کاشت کی مجبوری ہو تو کچھ مجوزہ اقسام 10 دسمبر تک کاشت کی جاسکتی ہیں۔

آپاش علاقہ جات

کچھیتی کاشت گندم کی پیداوار میں کمی

تحقیق کے مطابق کچھیتی کاشت فصل کی پیداوار میں روزانہ کی بنیاد پر بتدریج کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دانہ بننے اور بھرنے کے دوران اگر درجہ حرارت زیادہ بڑھ جائے تو کچھیتی کاشت گندم کی پیداوار میں نمایاں کمی آتی ہے۔ مزید یہ کہ کچھیتی کاشت میں بیج اُگنے میں زیادہ دن لیتا ہے، پودا شگوفے کم بناتا ہے اور سٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔

شرح بیج

آپاش علاقہ جات

بلحاظ وقت کاشت درج ذیل شرح بیج رکھیں۔ اگاؤ کی شرح 85 فیصد سے زیادہ ہو، بصورت دیگر شرح بیج میں اس کے مطابق اضافہ کر لینا چاہیے۔

شرح بیج	وقت کاشت	بروقت کاشت
40 کلوگرام فی ایکڑ	یکم نومبر تا 20 نومبر	بروقت کاشت
45 کلوگرام فی ایکڑ	21 نومبر تا 30 نومبر	کچھیتی کاشت
50 کلوگرام فی ایکڑ	یکم دسمبر تا 10 دسمبر	انتہائی کچھیتی کاشت

بیج کو زہر لگانا

گندم کی مختلف بیماریوں میں کانگاری، کرنال بنٹ، گندم کی بلاسٹ اور اکھیرا وغیرہ عام طور پر حملہ آور ہوتی ہیں اور پیداوار میں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ ان کے تدارک کے لئے بیج کو بوائی سے پہلے تھائیوفینیٹ میتھائل بحساب دوتا اڑھائی گرام یا امیڈاکلوپروڈ+ٹیپوکونازول بحساب 2 ملی لٹر فی کلوگرام بیج لگائیں۔

کپاس، مکئی اور کماد کے بعد گندم کی کاشت

وتر کا طریقہ

سابقہ فصل کے کاٹنے سے 15 تا 20 یوم قبل کھیت کو پانی دیں تاکہ چھڑیاں وغیرہ کاٹتے وقت زمین وتر حالت میں ہو اور کم سے کم وقت میں اچھی تیاری ہو سکے اور

بروقت گندم کاشت کی جاسکے۔ چھڑیاں وغیرہ کاٹنے کے فوراً بعد دو مرتبہ ہل اور ایک مرتبہ روٹاویٹر چلائیں۔ اگر روٹاویٹر میسر نہ ہو تو بھاری سہاگہ دیں۔ اس کے بعد بوائی بذریعہ ڈرل کریں تاکہ بیج یکساں اور مناسب گہرائی پر جائے اور اگاؤ بہتر ہو۔

خشک طریقہ

سابقہ فصل کی برداشت کے بعد اگر زمین میں وتر نہ ہو تو اس میں دو مرتبہ عام ہل اور ایک مرتبہ روٹاویٹر یا ڈسک ہیرو چلائیں۔ بوائی بذریعہ ڈرل کریں اور مناسب کیارے بنا کر کھیت کو پانی لگا دیں۔ خیال رہے کہ ڈرل کردہ بیج کی گہرائی ایک انچ سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرح وقت کی بچت ہوتی ہے اور اگاؤ بھی جلدی ہوتا ہے کیونکہ بیج کو مطلوبہ پانی وافر مقدار میں میسر آتا ہے۔ یہ طریقہ ہلکی میرا اور ریتلی زمین کے لئے موزوں ہے جبکہ بھاری زمینوں کے لئے موزوں نہیں ہے۔

گپ چھٹ کا طریقہ

چھٹی فصل کی برداشت کے بعد روٹاویٹر چلائیں۔ دو مرتبہ عام ہل چلائیں اور بھاری سہاگہ دیں۔ بعد ازاں کیاروں کے لئے وٹیں بنائیں اور کھیت کو پانی لگا دیں اور پھر 4 تا 6 گھنٹے کے لئے بھگوائے ہوئے بیج کا چھٹہ دیں۔ یہ طریقہ کلراٹھی زمینوں میں گندم کی کاشت کے لئے موزوں ہے کیونکہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے نمکیات کے مضر اثرات کم ہوتے ہیں۔ سخت اور کمزور نکاس والی زمینوں میں اس طریقہ سے گندم کاشت کرنے کیلئے بیج کو بھگونا ضروری نہیں ہے بلکہ بیج کا چھٹہ دینے سے پہلے پانی جذب ہونے کا انتظار کیا جائے۔

دھان کے بعد گندم کی کاشت

زمین کی نوعیت کے مطابق دھان کی فصل کو برداشت سے 15 تا 25 روز قبل پانی دینا بند کر دیں تاکہ فصل برداشت ہونے تک زمین وتر حالت میں آجائے اور بغیر انتظار کئے زمین تیار کر کے گندم کاشت کی جاسکے۔



دھان کی برداشت کے بعد وتر حالت میں ایک مرتبہ روٹاویٹر (Rotavator) یا دو دفعہ ڈسک ہیرو چلائیں۔ اس کے بعد ہل چلائیں اور سہاگہ دیں اور گندم کی بوائی کر دیں۔ یاد رہے دھان کی کٹائی کے بعد دھان کے ڈھوں اور باقیات کو آگ نہ لگائیں کیونکہ یہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کا باعث ہے۔ انسانی صحت پر اسکے دھوئیں کے مضر اثرات ہوتے ہیں اور فصل کی باقیات وزمین میں موجود اہم غذائی عناصر، مفید کیڑے اور خوردبینی جاندار جل کر ضائع ہو جاتے ہیں۔

زیرو ٹیلج یعنی زمین کی تیاری کے بغیر کاشت

اگر زیرو ٹیلج ڈرل یا سپر سیڈر (Super Seeder) میسر ہو تو دھان یا کسی بھی دوسری فصل کی برداشت کے بعد بغیر زمین تیار کئے اس کے ساتھ گندم کی بوائی

سے زیادہ گہرائی تک نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس طرح بیج دیر سے اُگتا ہے اور شگوفے بھی کم بنتے ہیں۔ ڈرل کے ذریعے کھاد استعمال کرتے وقت بیج اور کھاد ہرگز مکس نہ کریں بلکہ علیحدہ علیحدہ بکس میں ڈالیں اور نائٹروجنی کھاد مثلاً یوریا وغیرہ ڈرل کے ذریعے ہرگز استعمال نہ کریں۔ بوائی کرتے وقت ڈرل کو چیک کرتے رہیں، اگر بیج یا کھاد گرانے والا کوئی پائپ مٹی وغیرہ سے بند ہو جائے یا اس میں سے بیج/کھاد نہ گر رہی ہو تو مشین کو روک کر اسے ٹھیک کریں اور پھر بوائی شروع کریں۔

پٹر یوں پر کاشت

پٹر یوں پر کاشت سے پانی کی کمی اور زیادتی دونوں پر قابو پایا جاسکتا ہے یعنی فصل کی ضرورت کے مطابق بہتر طریقے سے پانی لگایا جاسکتا ہے اور بارش زیادہ ہونے



پر پانی کی نکاسی بھی زیادہ آسان ہے نیز فصل پٹر یوں پر پانی کی زیادتی کے دباؤ سے محفوظ بھی رہتی ہے۔ فصل کی جڑیں زمین میں زیادہ گہری چلی جاتی ہیں اور مضبوط ہونے کی وجہ سے آندھی یا بارش

کی وجہ سے فصل نہیں گرتی۔ فصل زیادہ بارش یا پہلے پانی کے بعد پھیلی نہیں ہوتی اور روایتی طریقہ کی نسبت اچھی پیداوار دیتی ہے مزید براں پٹر یوں پر کاشت کی گئی گندم میں کماد کی مخلوط کاشت بھی آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ مارکیٹ میں بیڈ پلانٹر مشین بھی میسر ہے۔

کریں۔ اس سے نہ صرف زمین کی تیاری پر آنے والے اخراجات کی بچت ہوتی ہے بلکہ فصل کی بروقت کاشت کو بھی یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ کمبائن ہارویسٹر سے دھان کی برداشت کے بعد کھیتوں میں ڈھیریوں کی شکل میں موجود فصل کی باقیات کو پھیلا دیں اور پھر زیرو تیج ڈرل یا سپر سیڈر سے گندم کی کاشت کریں۔ اس طریقہ کاشت کو اختیار کرتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی (سموگ) میں کمی کی جاسکتی ہے۔ اس طریقہ کو اختیار کرنے کے لئے زمین میں وتر کی مقدار مناسب ہونی چاہیے تاکہ اُگاؤ بہترین ہو سکے۔ تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دھان کی فصل کو کمبائن ہارویسٹر سے ذرا اونچا کاٹا جائے تو سپر سیڈر کے ساتھ گندم کی بوائی زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ سپر سیڈر کی اہمیت کے مد نظر محکمہ زراعت حکومت پنجاب اب بھاری سبسڈی فراہم کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان اس سے مستفید ہو سکیں۔

ڈرل کاشت اور اس کی افادیت

ڈرل کے ذریعے کاشت سے بیج ایک جیسے فاصلے پر یکساں گہرائی میں گرتے ہیں جس سے بیج کا اُگاؤ بہتر اور یکساں ہوتا ہے پودے سے پودے اور قطار سے قطار کا یکساں فاصلہ اور مناسب گہرائی کی وجہ سے گندم کی جڑیں زیادہ پھیلتی ہیں جس کی وجہ سے شگوفے زیادہ بنتے ہیں جو کہ چھٹے کے مقابلہ میں زیادہ پیداوار کا سبب بنتی ہے مزید برآں ڈرل کے ذریعے کاشت سے کھادوں کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ کھاد چونکہ پودوں کی جڑوں کے قریب گرتی ہے اور اس طرح فصل کھاد کا ہر دانہ استعمال کر سکتی ہے۔ ڈرل سے کاشت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بیج اڑھائی انچ

گندم کے لئے کھادوں کی سفارشات (آپاش علاقوں میں کھادوں کی سفارشات)

نوعیت زرخیزی زمین	غذائی عناصر (کلوگرام فی ایکڑ)			کھاد کی مقدار (بوریوں میں) فی ایکڑ
	پوٹاش	فسفورس	نائٹروجن	
کنورز زمین نامیاتی مادہ 0.86% تک فسفورس 7 پی پی ایم تک پوٹاش 80 پی پی ایم تک	64	46	25	دو بوری ڈی اے پی + دو بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی یا پانچ بوری ایس ایس پی (18 فیصد) یا ساڑھے چھ بوری ایس ایس پی (14 فیصد) + پونے تین بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی یا تین بوری ایس ایس پی (18 فیصد) یا چار بوری ایس ایس پی (14 فیصد) + دو بوری نائٹرو فاس + سوا تین بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی یا دو بوری ٹی ایس پی + پونے تین بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی
اوسط زرخیز زمین نامیاتی مادہ 0.86% تا 1.29% فسفورس 7 تا 14 پی پی ایم پوٹاش 80 تا 180 پی پی ایم	54	34	25	ڈیڑھ بوری ڈی اے پی + پونے دو بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی یا ایم او پی یا پانچ بوری ایس ایس پی (14 فیصد) + سوا دو بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی یا دو بوری ایس ایس پی (18 فیصد) یا اڑھائی بوری ایس ایس پی (14 فیصد) + ڈیڑھ بوری نائٹرو فاس + تین بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی یا ڈیڑھ بوری ٹی ایس پی + سوا دو بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی
زرخیز زمین نامیاتی مادہ 1.29% سے زائد فسفورس 14 پی پی ایم سے زائد پوٹاش 180 پی پی ایم سے زائد	46	30	25	سوا بوری ڈی اے پی + ڈیڑھ بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی یا سوا تین بوری ایس ایس پی (18 فیصد) یا سوا چار بوری ایس ایس پی (14 فیصد) + دو بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی یا دو بوری ایس ایس پی (18 فیصد) یا اڑھائی بوری ایس ایس پی (14 فیصد) + سوا بوری نائٹرو فاس + اڑھائی دو بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ + ایک بوری ایس او پی / ایم او پی

گرام کو 100 لٹر پانی میں ملا کر فی ایکڑ سپرے کریں۔ اس سپرے سے دانوں کا سائز بہتر ہو جاتا ہے جس سے فصل کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔

آپاشی

مختلف فصلات کے بعد کاشتہ گندم کی درج ذیل طریقہ کار کے مطابق آپاشی کریں۔ تاہم موسم کی نوعیت، زمین کی ساخت اور فصل کی ضرورت کے مطابق پانی لگانے کے جدول میں ردوبدل کیا جاسکتا ہے۔

کپاس، مکئی اور کماد کے بعد کاشتہ گندم

پہلا پانی: شگوفے نکلنے کے وقت یعنی بوئی کے 20 تا 25 دن بعد (اوپر کی جڑیں نکلنے کے وقت) اس مرحلے پر پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور پانی دیر سے لگانے کی صورت میں پودا شگوفے کم بناتا ہے اور فی پودا سٹوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔

دوسرا پانی: بوئی کے 80 تا 90 دن بعد (گوبھ کے وقت)

اس وقت سٹے بن رہا ہوتا ہے اور باہر نکلنے کے مراحل میں ہوتا ہے۔ اگر اس مرحلے پر پانی نہ دیا جائے یا تاخیر سے دیا جائے تو سٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ان میں دانوں کی تعداد کم رہ جاتی ہے اور پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

تیسرا پانی: دانہ بننے کی ابتداء یعنی بوئی کے 125 تا 130 دن بعد۔ (دودھیا حالت) یہ سٹے میں دانہ بننے اور بھرنے کا وقت ہے۔ اگر اس مرحلے پر پانی نہ دیا جائے یا تاخیر سے دیا جائے تو دانے کا سائز چھوٹا اور وزن کم رہ جاتا ہے جس سے پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

نوٹ۔ اگر موسم متواتر گرم اور خشک رہے تو پہلے اور دوسرے نیز دوسرے اور تیسرے پانی کے درمیانی وقفہ میں ضرورت کے مطابق ایک زائد پانی لگائیں۔

دھان کے بعد کاشتہ گندم

پہلا پانی: بوئی کے 35 تا 45 دن بعد

دھان کے وڈھ میں چونکہ وتر زیادہ ہوتا ہے اس لئے گندم کی فصل کو پہلا پانی قدرے تاخیر سے لگایا جائے تاکہ زمین نرم رہے، پودے کی جڑوں کو ہوا کی مناسب فراہمی جاری رہے اور پودا زیادہ جڑیں اور شگوفے بنا سکے۔

دوسرا پانی: بوئی کے 80 تا 90 دن بعد (گوبھ کے وقت)

تیسرا پانی: دانہ بننے کی ابتداء یعنی بوئی کے 125 تا 130 دن بعد (دودھیا حالت)

چکھیتی کاشتہ فصل کو آپاشی

پہلا پانی: شاخیں نکلنے کے وقت (بوئی کے 25 تا 30 دن بعد)

دوسرا پانی: گوبھ کے وقت (بوئی کے 70 تا 80 دن بعد)

تیسرا پانی: دانے بننے کی ابتدائی حالت (بوئی کے 110 تا 115 دن بعد) (دودھیا حالت)

بوئی کے بعد کھیلیاں بنانا

محکمہ زراعت پنجاب شعبہ اڈاپٹیو ریسرچ، شعبہ ریسرچ اور پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے تجربات کے مطابق یہ اخذ کیا گیا ہے کہ جو زمینیں جلد پانی جذب نہیں کرتیں وہاں پر چھٹے کے طریقہ سے گندم کی



بوئی کرنے کے بعد رجر کے ساتھ کھیلیاں بنائی جاسکتی ہیں۔ اس طریقہ کاشت سے آپاشی علاقوں میں مثبت نتائج حاصل ہوئے ہیں خصوصاً چاول کے علاقہ اور چکنی زمینوں پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے ہیں تاہم ریتیلی زمینوں میں یہ طریقہ موزوں نہیں ہے۔

کھادوں کے استعمال کا طریقہ

- فاسفورسی اور پوٹاش کھاد کی ساری مقدار اور نائٹروجنی کھاد کی پہلی قسط بوئی کے وقت استعمال کریں
- زیادہ بہتر ہے کہ بوئی کے وقت فاسفورسی اور پوٹاش کھاد کا استعمال ڈرل کے ذریعہ کریں، اس سے کھادوں کی افادیت بڑھ جاتی ہے
- نائٹروجنی کھاد 2 یا 3 برابر اقساط میں استعمال کریں جبکہ ریتلے علاقوں میں 4 یا زیادہ اقساط میں ڈالیں کیونکہ ایسی زمینوں میں اس کے ضائع ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے
- اگر فاسفورسی یا پوٹاش کھاد بوقت کاشت نہ ڈالی جاسکے تو پہلے پانی کے ساتھ ڈال دیں۔ چکھیتی کاشت کی صورت میں کھادوں کی پوری مقدار بوقت بوئی ہی ڈال دیں
- شورزدہ / کلراٹھی زمینوں میں کیمیائی تجزیہ کے مطابق مون سون سے پہلے جپسم استعمال کریں
- ترقی پسند کاشتکار 2 بوری ڈی اے پی فی ایکڑ استعمال کریں۔


گندم میں عناصر صغیرہ کا استعمال

گندم کی فصل کے لئے زنک سلفیٹ ($ZnSO_4$) 33 فیصد بحساب 6 کلو گرام یا 27 فیصد بحساب 7.5 کلو گرام یا 21 فیصد بحساب 10 کلو گرام اور بورک ایسڈ 17 فیصد بحساب 2.50 کلو گرام فی ایکڑ بوئی کے وقت استعمال کرنے سے گندم کی پیداوار پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر سابقہ فصل میں زنک سلفیٹ استعمال کی گئی ہو تو گندم کی فصل میں اس کا استعمال نہ کریں۔

نوٹ: اگر عناصر صغیرہ بوئی کے وقت نہیں ڈالے گئے تو پھر جب فصل گوبھ کی حالت میں ہو تو اس وقت زنک سلفیٹ (33%) 350 گرام، کارپ سلفیٹ 350 گرام، فیرس سلفیٹ 350 گرام، مینگانیز سلفیٹ 350 گرام، بورک ایسڈ 350

جڑی بوٹیوں کی تلفی

گندم کی زیادہ اور معیاری پیداوار حاصل کرنے کے لئے جڑی بوٹیوں کی تلفی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کریں۔



غیر کیمیائی انسداد

- فصلوں کا اڈل بدل کریں اور گندم والے کھیتوں میں دو تا تین سال بعد چارہ برسیم وغیرہ کاشت کریں۔
- اگر ممکن ہو تو پہلے پانی کے بعد وتر آنے پر دوہری بارہیر و چلائی جائے۔ اس سے جڑی بوٹیاں بہت حد تک تلف ہو جاتی ہیں اور زمین میں وتر دیر تک قائم رہتا ہے۔
- داب کا طریقہ بھی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے موثر ترین عمل ہے اس کے لیے وتر آنے پر رنبر مار کر کم از کم ایک یا دو ہل چلا کر سہاگہ دیں۔ زمین کو 5-7 دنوں کے لیے یونہی پڑا رہ دینے سے زمین میں وتر آنے پر جڑی بوٹیاں اگ آئیں گی جو کاشت کے لیے زمین کی تیاری کے دوران تلف ہو جائے گی۔

کیمیائی انسداد

مندرجہ ذیل جڑی بوٹی مارزہریں محکمہ زراعت توسیع یا پیسٹ وارنگ کے عملہ کے مشورہ سے استعمال کریں۔

- گندم کی فصل میں چوڑے پتے والی اور نوکیلے پتے والی یعنی گھاس نماء جڑی بوٹیاں اگتی ہیں۔ لہذا ان کی مناسبت سے جڑی بوٹی مارزہر کا انتخاب کریں۔ جڑی بوٹیوں کی مناسبت سے پہلے پانی کے بعد چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کے لئے سفارش کردہ زہر کا سپرے کریں۔ دوسرے پانی کے بعد نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کے لئے سپرے کی جائے تو بیشتر جڑی بوٹیوں کا یقینی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دونوں قسم کی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے والی زہریں بھی میسر ہیں جو تقریباً 40 تا 45 دن کی فصل پر کی جاسکتی ہیں اور ان سے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا کیمیائی انسداد

نمبر شمار	اصل زہر	مقدار فی ایکڑ
1	کلوڈینا فاپ پراپر جائیل	120 گرام
2	فینا کسا پراپ پی ایٹھائل	500 ملی لیٹر
3	پنا کساڈین	330 ملی لیٹر
4	ٹراکاکسیڈیم + فینا کسا پراپ پی ایٹھائل + کلوڈینا فاپ پراپر جائیل	500 ملی لیٹر
5	کلوڈینا فاپ + فلوکاربازون سوڈیم	300 ملی لیٹر
6	سلفوسلفیوران	13.5 گرام

نوٹ: یہ زہریں 40 دن یا دوسراپانی لگنے کے بعد نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں اگ آنے پر سپرے کریں۔



چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا کیمیائی انسداد

نمبر شمار	اصل زہر	مقدار فی ایکڑ
1	ٹرائی سلفوران	16 گرام
2	بروموکسل + ایم سی پی اے	300 ملی لیٹر
3	فلوراکسی پائیر + ایم سی پی اے	375 ملی لیٹر
4	فلوراسولم + امانوپائراڈ	12.5 گرام
5	میٹ سلفیوران میتھائل + مٹرائی بینوران میتھائل	14 گرام
6	فلوراکسی پائیر + ٹرائی بینوران میتھائل	400 گرام
7	کارفیٹرون میتھائل	20 گرام
8	فلوراکسی پائیر + فلوراسولم + ایم سی پی اے	400 ملی لیٹر
9	کلورپائراڈ + فلوراکسی پائیر + ٹرائی بینوران میتھائل	150 گرام
10	ٹرائی بینوران میتھائل + فلوراسولم	24 گرام
11	کلورپائراڈ + فلوراکسی پائیر + ایم سی پی اے	175 گرام

نوکیلے اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والی جڑی بوٹی مارزہریں

نمبر شمار	اصل زہر	مقدار فی ایکڑ
1	پینڈی میتھالین + آئسو پروٹوران	1000 ملی لیٹر
2	میزوسلفیوران میتھائل + فلوراسولم	120-150 ملی لیٹر
3	آئسو پروٹوران + کارفینٹرون میتھائل	800 گرام
4	میزوسلفیوران + آئیڈو، وسلفیوران	100 گرام
5	پائراکسولم	150 ملی لیٹر
6	آئسو پروٹوران + ٹینسلفیوران	600 ملی گرام
7	میزوسلفیوران	150 ملی لیٹر
8	میزوسلفیوران میتھائل + فلوراسولم + فلوراکسی پائیر	120 ملی لیٹر
9	میزوسلفیوران میتھائل + فلوراسولم + ایم سی پی اے	400 ملی لیٹر
10	پناکساڈین + فلوراکسی پائیر میٹائل + ایم سی آئسو اوکٹائل	300 ملی لیٹر

سلائی سٹی اور تمام اقسام کی جڑی بوٹیوں کا کیمیائی انسداد

نمبر شمار	اصل زہر	مقدار فی ایکڑ
1	سائپر فلوآن + آئیسوپروٹوران	1100 ملی لیٹر



کمبائن ہارویسٹر کا استعمال

گندم کی کٹائی کمبائن ہارویسٹر سے کریں اور بہتر ہے کہ کمبائن گندم والی استعمال کریں تاکہ کٹائی کے دوران گندم کے دانے نہ ٹوٹیں اگر دھان والی کمبائن استعمال کرنی ہو تو اس میں گندم کی کٹائی کی کٹ لگوائیں جس سے دانوں کے ٹوٹنے کا احتمال کم ہو جاتا ہے اور پیداوار متاثر نہیں ہوتی۔

گندم کی اچھی پیداوار کے حصول کے لئے اہم سفارشات

- سفارش کردہ اقسام کو سفارش کردہ وقت و شرح بچ کے مطابق کاشت کریں۔
- بیماری سے پاک، صحت مند اور تصدیق شدہ بچ سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔
- اگر کسی وجہ سے تصدیق شدہ بچ میسر نہیں اور گھر کا بچ استعمال کرنا ہے تو منظور شدہ قسم کا انتخاب کریں، بچ کو اچھی طرح صاف کریں، اس کی گریڈنگ کریں اور سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔ خصوصاً جن علاقوں میں کھلی کانگاری کے حملہ کا خدشہ ہو وہاں بچ کو زہر لگانا بہت ضروری ہے۔

بچ کا انتظام کرتے وقت بچ کی شرح اگاؤ ضرور چیک کریں اور تسلی کر لیں کہ یہ 85 فی صد یا اس سے زیادہ ہو۔

آپاش علاقوں میں گندم کا بہترین وقت کاشت یکم نومبر تا 20 نومبر ہے، تاہم 30 نومبر تک کاشت کی جاسکتی ہے۔ اگر کچھیتی کاشت ناگزیر ہو تو گندم کی مجوزہ اقسام کی بوائی 10 دسمبر تک مکمل کریں۔

آپاش علاقوں میں بروقت کاشت (یکم نومبر تا 20 نومبر) کے لیے 40 کلوگرام فی ایکڑ، کچھیتی کاشت (21 نومبر تا 30 نومبر) کے لیے 45 کلوگرام فی ایکڑ بچ جبکہ انتہائی کچھیتی کاشت (یکم دسمبر تا 10 دسمبر) کی صورت میں 50 کلوگرام فی ایکڑ شرح بچ استعمال کریں۔

گندم کی بوائی کرتے وقت کھیت کے وتر کا خاص خیال رکھیں، کھیت کا وتر مناسب ہونا چاہیے تاکہ بوائی کا عمل بہتر طریقے سے مکمل ہو سکے اور بہترین اگاؤ سے پودوں کی فی ایکڑ مطلوبہ تعداد حاصل کی جاسکے۔ ہمیشہ مناسب وتر حالت میں ہی بوائی کریں۔

گندم کی کاشت ترجیحاً بذریعہ ریل کریں اور بوائی کے وقت ڈالی جانے والی سفارش کردہ کھادیں جو ممکن ہوں بذریعہ ریل استعمال کریں۔ کھاد اور بچ ہرگز مکس نہ کریں بلکہ علیحدہ علیحدہ بکس میں ڈالیں۔ ریل کے استعمال سے پہلے دیئے گئے طریقہ کے مطابق اس کی بچ اور کھاد گرانے کی شرح کو مطلوبہ فی ایکڑ مقدار کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں۔

اگر فاسفورسی یا پوٹاش کھاد بوقت کاشت نہ ڈالی جاسکے تو پہلے پانی کے ساتھ ڈال دیں۔ کچھیتی کاشت کی صورت میں کھادوں کی پوری مقدار بوقت بوائی ہی ڈال دیں۔

ڈرل سے بوائی کرتے وقت چیک کرتے رہیں کہ بچ اور کھاد گرانے والے پائپ صحیح کام کر رہے ہیں، یہ بند تو نہیں ہیں، اگر کوئی پائپ مٹی وغیرہ سے بند ہو جائے تو مشین روک کر اسے ٹھیک کریں اور پھر بوائی شروع کریں۔ دھان کے علاقوں اور چکنی زمینوں پر جہاں پانی کھڑا رہتا ہو، گندم کی کاشت وٹوں پر کریں۔

جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی پر خصوصی توجہ دیں اور اس ضمن میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں

سست تیلے سے بچاؤ کے لئے گندم کے کھیتوں میں ہر 100 فٹ کے فاصلہ پرسرسوں / کینولا وغیرہ کی دولائیں کاشت کریں۔

گندم کی کنگی سے بچنے کے لیے قوت مدافعت رکھنے والی سفارش کردہ اقسام کاشت کریں اور شدید بیماری کی صورت میں محکمہ زراعت کی سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر کا سپرے کریں۔

کپاس، مکئی اور کماد کے بعد کاشتہ فصل کو پہلا پانی بوائی کے 20 تا 25 دن بعد اور دھان کے وڈھ میں کاشتہ فصل کو پہلا پانی 35 تا 45 دن بعد لگائیں، بقیہ



زمین میں موجود جرثوموں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں

ڈاکٹر عامر رسول، حبیب انور، ڈاکٹر سبین فاطمہ

نظامت اعلیٰ زراعت (پیٹ وارنگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیٹسیائیڈز) پنجاب

زمین میں مختلف جرثوموں کی موجودگی سے پھیلنے والی بیماریوں کی تشخیص تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کی علامات زیر زمین ہوتی ہیں اور پتوں کی بیماریوں کی طرح نمایاں نہیں ہوتیں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے پودا صحیح سے بڑھ نہیں پاتا کمزور رہ جاتا ہے اور مختلف بیماریوں اور کیڑوں کے حملے کی زد میں رہتا ہے۔ ان بیماریوں میں جڑوں کا گلاؤ (Root Rot) اور کراؤن راٹ (Crown Rot) زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔

❖ فیوزیریئم جڑ اور تنے کا گلاؤ (Fusarium foot and crown rot)



یہ بیماری فیوزیریئم کی مختلف اقسام کی وجہ سے ہوتی ہے جن میں فیوزیریئم گرمینیرم (Fusarium graminearum) زیادہ اہم ہے۔ جڑوں سے شروع ہوتی ہوئی پھیلی گانٹھوں کو متاثر کرتی ہے۔ جڑیں بھوری رنگت کی ہو جاتی

ہیں اور جڑوں سے اوپر تنے کا رنگ بدل جاتا ہے اور چاکلیٹی یا سرخی مائل بھورے نشانات تنے کے اوپر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تنے کو کاٹا جائے تو گلابی رنگ کی روئی دار پھپھوندی نظر آتی ہے۔ سٹے سفید رنگ کے بغیر دانوں کے بنتے ہیں اور پودے خشک ہو جاتے ہیں۔ خشک سالی اور گرم موسم میں اس بیماری کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زمین میں موجود فصل کی متاثرہ باقیات سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔

❖ جڑوں کا گلاؤ (Common Root Rot)

یہ بیماری ایک پھپھوندی بائی پولیرس سورو کینینا / کوکلیوبولس سٹیوس (Cochliobolus sativus / Bipolaris sorokiniana) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس



بیماری سے پودے جلدی مر جاتے ہیں اور سفید رنگ کے سٹے پورے کھیت میں بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں۔ متاثرہ پودے کی جڑیں ٹھیک سے نہیں بنتیں اور تنے کے زمین کے ساتھ والے حصے پر گہرے بھورے رنگ کے نشانات نظر آتے

آپاشی فصل کی نازک حالتوں مثلاً گوبھ اور دانے کی دودھیا حالت پر کریں۔ اگر موسم متواتر گرم اور خشک رہے تو فصل کی ضرورت کے مطابق زائد پانی لگائیں۔

❖ تھل کے علاقہ جات اور دیگر گرم ریتلے علاقوں میں مقامی موسمی حالات کے پیش نظر گندم کی فصل کو عام طور پر تقریباً 6 مرتبہ آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا فصل کی ضرورت اور موسمی صورت حال کے مطابق آپاشی کریں۔

❖ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں 15 مارچ اور شمالی اور وسطی پنجاب کے علاقوں میں 25 مارچ تک آخری آپاشی مکمل کر لیں تاہم موسمی حالات اور فصل کی ضرورت کے پیش نظر پانی اس کے بعد بھی لگایا جاسکتا ہے۔

❖ جوزمینیں پانی جلد جذب نہیں کرتیں، ان سے بارش کے زائد پانی کی نکاسی کا بندوبست ضرور کریں۔

❖ فصل کو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں پانی لگانے اور فصل کو زیادہ پانی کے اثرات سے بچانے کے لئے گندم کے کھیتوں میں کیارے چھوٹے بنائیں۔

❖ موسمیاتی تبدیلیوں سے فصل پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان اثرات کو کم سے کم کرنے کے لئے فصل کی کاشت سفارش کردہ وقت پر کریں، فصل کی خصوصی نگہداشت کریں اور تحفظ نباتات کا خاص خیال رکھیں، موسمی پیشین گوئی سے باخبر رہیں، بارش کے زائد پانی کو کھیتوں سے نکال دیں، موسم خشک اور گرم رہنے پر فصل کی ضرورت کے مطابق زائد آپاشی کریں۔

❖ فصل کی برداشت کمبائن ہارویسٹر سے کرنے کی صورت میں ویٹ سٹرا چاپر (Wheat Straw Chopper) کی مدد سے توڑی بنائیں۔

❖ فصل کی کٹائی اور گہائی کے دوران پیداوار میں ہونے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں یعنی استعمال ہونے والی مشین کو کام کے دوران چیک کرتے رہیں، اگر دانے ٹوٹ رہے ہوں یا توڑی وغیرہ میں جا رہے ہوں تو مشین کے نقص کو دور کریں اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

❖ فصل کی باقیات کو ہرگز نہ جلائیں، اسے صحیح طور پر استعمال کریں یعنی توڑی بنا کر بطور چارہ استعمال کریں یا زمین میں ملا کر اس کی زرخیزی میں اضافہ کریں۔

❖ گندم کی برداشت کے بعد اگر اگلی فصل کی کاشت میں ڈیڑھ دو ماہ کا وقفہ ہو تو سبز کھاد والی کوئی فصل مثلاً جنتر، مونگ، گوار یا رواں وغیرہ کی کاشت کریں اور پھول آنے پر روٹاویٹر کے ذریعے زمین میں ملا دیں اور پھر اگلی فصل کاشت کریں۔ اس طرح بعد میں آنے والی فصل کی کھاد کی ضرورت کم کرنے اور زمین کی زرخیزی بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔

❖ جنس کو ذخیرہ کرنے سے پہلے گوداموں کی اچھی طرح صفائی کریں اور کیڑوں کے تدارک کے لئے سپرے / فیمیکیشن کریں۔

ہیں، یہ پتلا سا تناسب کراؤن انٹرنوڈ (Subcrown internode) کہلاتا ہے اس کے برعکس صحت مند تنا مضبوط اور زردی مائل سفید ہوتا ہے۔

❖ اکھیرا (Take all Root and Crown Rot)



یہ بیماری ایک پھپھوندی گیمینو مائیسس گریمنس *Gaeumannomyces graminis* (f. sp. tritici) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ پودوں کی جڑیں اور سطحی تنا سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری کھیت کے زیادہ نمی والے حصوں میں اور کناروں کے ساتھ جہاں یہ پھپھوندی دوسری گھاس نما جڑی بوٹیوں پر پرورش پاتی ہے زیادہ شدید ہوتی ہے۔

گندم کی بیج اور زمین میں موجود جرثوموں سے ہونے والی بیماریوں کا انسداد

عام طور پر گندم میں بیج اور زمین سے منتقل ہونے والی بیماریوں کو بذریعہ سیڈ ٹریٹمنٹ اور فصل کے ہیر پھیر سے کنٹرول کیا جاتا ہے کیونکہ ان بیماریوں کے خلاف گندم کی اقسام میں قوت مدافعت نہیں ہوتی۔ صحت مند اور اچھی کوالٹی کا بیج کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ فصل حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔



سیڈ ٹریٹمنٹ سے مراد بیج کو بوائی سے قبل ایسے طبعی، کیمیائی یا حیاتیاتی عوامل سے گزارنا ہے جن کی بدولت بیج پر موجود بیماری کے جرثوموں کا نہ صرف خاتمہ ممکن بنایا جاتا ہے بلکہ زمین میں موجود بیج پر حملہ آور ہونے والی بیماریوں سے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے تاکہ فصل کا عمارہ آگاہ اور بہترین پیداوار حاصل کی جاسکے۔

بیج کی ٹریٹمنٹ کے طریقے

❖ طبعی طریقے:

یہ طریقے بیج کے اندر اور اوپری سطح پر موجود جرثوموں کے خلاف کافی موثر ہیں جو کہ درج ذیل ہیں

i. ہاٹ واٹر

یہ طریقہ بیج میں موجود بیکٹریا، وائرس اور فنجائی کے لئے انتہائی موثر ہے۔ اس طریقہ کار میں پہلے بیج کو 20 تا 30 ڈگری سینٹی گریڈ میں پانچ گھنٹوں کے لئے بھگوایا جاتا ہے تاکہ غیر فعال مائیسیم (dormant mycelium) متحرک ہو جائے اور پھر

50 تا 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم پانی میں 10 منٹ کے لئے بھگونے سے مائیسیم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیج کو سایہ دار جگہ پر خشک کر لیا جاتا ہے۔

ii. خشک ہوا کے ذریعے بیج کی ٹریٹمنٹ

(Solarization / Dry Heat Treatment)

یہ طریقہ زیادہ تر گرم ممالک میں زیر استعمال ہے جس میں سورج کی تیز شعاعوں میں بیج کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ مختلف قسم کے وائرس اور فنگس سے ہونے والی بیماریوں نیز کیڑوں کو ختم کیا جاسکے۔ یہ طریقہ گندم کی کھلی کانگاری کے لئے انتہائی موثر ہے اس عمل میں بیج کو 4 گھنٹے (صبح 8 بجے تا دوپہر 12 بجے) کے لئے پانی میں بھگوایا جاتا ہے اس کے بعد بیج کو پتلی تہہ میں سورج کی تیز روشنی میں بکھیر کر خشک کر لیا جاتا ہے۔ تیز دھوپ کی وجہ سے بیج میں موجود پھپھوندی مر جاتی ہے۔

iii. شعاعوں کے ذریعے سیڈ ٹریٹمنٹ

مختلف قسم کی الیکٹرو میگنیٹک شعاعیں جن میں گیمما، ہائی انرجی الیکٹرون، الٹرا سونک، مائیکرو ویو اور یووی ریڈیشن بیج میں موجود جرثوموں کے خاتمے کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ تکنیکی طور پر یہ طریقہ اختیار کرنے کے لئے جدید آلات اور مشینری کی ضرورت ہوتی ہے۔

❖ حیاتیاتی طریقہ / مفید جرثوموں کا استعمال

بیج کی مفید بیکٹریا اور پھپھوندی (Beneficial microorganisms) کے ذریعے ٹریٹمنٹ فصل کو مختلف قسم کی بیماریوں، موسمی تغیرات اور ماحولیاتی تناؤ سے محفوظ رکھتی ہے۔ ان مفید جرثوموں میں ٹرائکوڈرما، بیسیلس، سوڈوموناس اور رائزوبیا شامل ہیں۔ یہ مفید جرثومے مختلف طریقوں سے بیماری پھیلانے والے جرثوموں پر حملہ آور ہوتے ہیں جن میں پیراسیٹرم یعنی مفید مائیکرو اور گنیزم کا بیماری پھیلانے والے جرثوموں کے اوپر یا ان کے اندر رہ کے انہیں ختم کرنا، مقابلہ، مخاصمت اور اینٹی بائیوس یعنی مائیکرو اور گنیزم کا ایسے کیمیکل خارج کرنا جو کہ بیماری پھیلانے والے جرثوموں کو بڑھنے نہ دیں۔ مفید بیکٹریا یا ناصرف پیداوار کو بڑھاتے ہیں بلکہ زمین میں موجود فاسفورس اور نائٹروجن پودے کو فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں جس سے کھادوں کا استعمال کم ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق طبعی اور حیاتیاتی طریقوں کا ایک ساتھ استعمال کافی موثر ثابت ہوا ہے۔

❖ کیمیائی طریقہ

بیج کو زہر لگانا پودے کو صحت مند آغاز کا موقع فراہم کرتا ہے۔ گندم کی بوائی سے پہلے بیج پر پھپھوندی کش زہر کا استعمال بیج اور زمین کے ذریعے منتقل ہونے والی بیماریوں کے نقصان کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کچھ زرعی زہروں میں پھپھوندی کش زہر کے ساتھ ساتھ کیڑے مارز بھی شامل ہوتا ہے جو کہ ابتدائی فصل پر تیلے کے حملے کو کم کرنے میں اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے۔

موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں بائیوچار کی اہمیت

موسمیاتی تبدیلی آج دنیا کا سب سے بڑا ماحولیاتی چیلنج بن چکی ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، غیر معمولی بارشیں، شدید خشک سالی، سیلاب اور مٹی کی زرخیزی میں کمی براہ راست کاربن کے زیادہ اخراج سے جڑے ہوئے مسائل ہیں۔ ایسے حالات میں بائیوچار ایک موثر، کم لاگت اور دیرپا حل کے طور پر مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ بائیوچار ایسی شکل میں کاربن کو مٹی میں محفوظ کرتا ہے جو سینکڑوں سال تک تحلیل نہیں ہوتی۔ اس طرح فضاء میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کم ہوتی ہے۔ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی واقع ہوتی ہے اور گلوبل وارمنگ کی رفتار سست ہوتی ہے۔

سبزی منڈی کا فضلہ اگر کھلی فضا میں سڑتا رہے تو میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ جیسی انتہائی خطرناک گرین ہاؤس گیسیں بنتی ہیں۔ جب یہی فضلہ بائیوچار میں تبدیل کر دیا جائے تو ان گیسوں کا اخراج نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے جو کہ بہترین نامیاتی کھاد بن کر موسمیاتی تبدیلی کے خلاف ایک بہت مضبوط مادہ بن جاتا ہے اور ہماری زراعت کے مستقبل کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔

زرعی زمینوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مدافعت پیدا کرنا

- بائیوچار مٹی کی صحت بہتر بنا کر فصلوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصان دہ اثرات سے بچاتا ہے۔
- شدید دھوپ میں پانی کے ضیاع کو کم کرتا ہے۔
- خشک سالی کے دوران نمی برقرار رکھتا ہے۔
- بھاری بارشوں میں مٹی کو کٹاؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔
- خراب زمینوں کو دوبارہ قابل کاشت بناتا ہے۔
- سردی کے موسم میں کورے کے نقصان دہ اثرات کو کم کرتا اور ضروری غذائی عناصر کو دیر تک مہیا کرنے میں معاونت شامل ہے۔

پائیدار فضلہ مینجمنٹ

سبزی منڈی کے فضلہ کو بائیوچار میں تبدیل کرنا ایک ماحول دوست طریقہ ہے۔ شہروں کو صاف رکھتا ہے سرکلر کانومی کو فروغ دیتا ہے کاربن نیوٹرل یا کاربن نیگیٹو ماحول کی طرف قدم ہے۔

شعبہ سوائل کیمسٹری میں بائیوچار کی تیاری

شعبہ سوائل کیمسٹری سیکشن ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ میں سبزیوں اور پھلوں کی باقیات سے بائیوچار کو تیار کیا گیا اس تحقیقی/عمل میں بائیوچار تیار کرنے کے لیے خام مال



سبزیوں اور پھلوں کی باقیات سے تیار کردہ بائیوچار کی مٹی کی بہتری کے لئے اہمیت

آمنہ کلثوم، ڈاکٹر انا اسلم، ڈاکٹر محمد عرفان الحق، ڈاکٹر عابد نیاز، ڈاکٹر قدسیہ نذیر

سوائل کیمسٹری سیکشن، ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ، فیصل آباد

دنیا بھر نامیاتی کاشتکاری کو وسیع پیمانے پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ غذائی اشیاء کے ضیاع اور فصلات کی باقیات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سبزی منڈیاں روزانہ ٹنوں کے حساب سے سبزی اور پھلوں کا فالتو مواد پیدا کرتی ہیں، جو اکثر کچرے کے ڈھیروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ فضلہ نہ صرف ماحول کو آلودہ کرتا ہے بلکہ بدبو، بیماریوں اور کاربن کے اخراج کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس مسئلے کا ایک موثر اور پائیدار حل نامیاتی مادہ یعنی بائیوچار کی صورت میں موجود ہے۔

بائیوچار

بائیوچار نامیاتی باقیات کو آکسیجن کی کم موجودگی میں جلانے (Pyrolysis) کے عمل سے حاصل ہونے والا ایک کاربن مادہ ہے۔ یہ مٹی کی زرخیزی بڑھانے، پانی کی جاذبیت اور ذخیرہ اندوزی بہتر کرنے، آلودگی کم کرنے اور زمین میں کاربن کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔

بائیوچار کے فوائد

- بائیوچار مٹی کی کیفیت کو کئی حوالوں سے بہتر کرتا ہے جیسے کہ
- 1- مٹی کی زرخیزی میں اضافہ
- 2- نمی برقرار رکھنے کی صلاحیت بہتر ہونا
- 3- نامیاتی مادے میں اضافہ
- 4- پودوں کی غذائی ضروریات کو طویل عرصہ تک برقرار رکھنا
- 5- مٹی کی ساخت کو بہتر بنانا
- 6- کاربن کو طویل عرصہ تک مٹی میں ذخیرہ کر کے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنا
- 7- پھلوں اور سبزیوں کی باقیات سے ایک خاص درجہ حرارت پر تیار شدہ بائیوچار کے استعمال سے زمین کی pH کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ڈالی گئی کیمیائی کھادوں کی افادیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کیمیائی کھادوں کا استعمال 15 سے 20 فیصد تک کم کیا جاسکتا ہے۔

زرخ سفا زشت

شہباز اختر، ڈائریکٹر جنرل زراعت (توسیع) پنجاب، لاہور

چنا

❖ چنے کی بروقت کاشت کریں۔ مختلف علاقوں کے لیے چنے کا وقت کاشت مختلف ہے۔ مثلاً گجرات، نارووال، جہلم اور راولپنڈی کے لیے 15 اکتوبر تا 10 نومبر، تھل (بھکر، خوشاب، میانوالی، لیہ اور جھنگ) کے بارانی علاقوں کے لیے ماہ اکتوبر اور آبپاش علاقوں کے لیے 20 اکتوبر تا 15 نومبر اور آبپاش علاقوں فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، بہاولنگر اور وسطی و جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کے لیے آخر اکتوبر تا 15 نومبر جبکہ زیادہ زرخیز اور ستمبر کاشتہ کماد میں چنے کا وقت کاشت 20 اکتوبر تا 10 نومبر ہے۔

❖ چنے کی عام جسامت والی اقسام کے لیے شرح بیج 30 کلوگرام اور موٹی جسامت والی اقسام کے لیے 35 کلوگرام فی ایکڑ رکھیں۔

❖ چنے کی کاشت ہمیشہ ڈرل یا پور سے کریں تاکہ بیج مناسب وتر میں گرے اور بیج کی روئیدگی اچھی ہو۔ ریتیلی میرا اور اوسط درجہ کی زرخیز زمینوں میں قطاروں کا فاصلہ ایک فٹ جبکہ میرا اور زیادہ بارش والے علاقوں میں فاصلہ ڈیڑھ فٹ ہو اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 6 انچ ہو

❖ ستمبر کاشتہ کماد میں کابلی چنے کی مخلوط کاشت بڑی کامیاب رہی ہے۔ چار فٹ کے فاصلہ پر کاشتہ کماد میں بیڈ پر چنے کی دو لائنیں جبکہ دو تا اڑھائی فٹ کے فاصلہ پر کاشتہ کماد میں چنے کی ایک لائن کاشت کریں۔ جس کے لیے شرح بیج 15 تا 20 کلوگرام فی ایکڑ رکھیں۔

❖ آبپاش علاقوں میں ایک بوری ڈی اے پی + چوتھائی بوری یوریا + آدھی بوری ایس او پی یا ڈیڑھ بوری یا نائٹرو فاس + ایک بوری ایس ایس پی (18%) + آدھی بوری ایس او پی یا اڑھائی بوری ایس ایس پی (18%) + دو تہائی بوری یوریا + آدھی بوری ایس او پی فی ایکڑ بوائی کے وقت استعمال کریں۔

❖ بارانی علاقہ جات کے لیے ایک بوری ڈی اے پی + آدھی بوری ایس او پی فی ایکڑ بوائی کے وقت استعمال کریں۔

مقامی سبزی منڈی سے اکٹھا کیا گیا جو کہ روزانہ بڑی مقدار میں سبزیوں اور پھلوں کی چھلکے، خراب شدہ ٹکڑے، پتے اور گودے کو الگ الگ کر کے جمع کیا جاتا ہے اور یہ مواد نہ صرف مفت دستیاب ہوتا ہے بلکہ ماحول دوست طریقے سے دوبارہ سے قابل استعمال ہو سکتا ہے۔

بائیوچار کی تیاری کا عمل

سبزی اور پھلوں کی باقیات کو مٹی، پلاسٹک اور دیگر چیزوں سے پاک کر کے دھوپ میں خشک کیا گیا تاکہ نمی کم ہو جائے۔ بعد ازاں خشک مواد کو ڈرم/اوون میں محدود آکسیجن میں گرم کیا جاتا ہے جسے پائرولائسر کہتے ہیں بائیوچار کو ٹھنڈا کر کے ہوابند ڈبوں میں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ یہ نمی جذب نہ کرے۔

سیکشن ہذا میں نہ صرف بائیوچار کو تیار کیا گیا بلکہ اس کو بہترین حالت میں نامیاتی کھاد کے طور پر تجزیہ کیا گیا ہے اور بائیوچار میں درج ذیل غذائی عناصر پائے گئے ہیں۔

بائیوچار میں موجود غذائی عناصر

غذائی عناصر	مقدار
نامیاتی کاربن	55%
نائٹروجن	1.4%
فاسفورس	0.5%
پوٹاشیم	2.2%

بائیوچار ایک دیرپا نامیاتی کھاد ہے جو کہ زیادہ عرصے تک زمین میں موجود رہتی ہے اور اس کا اثر دیر تک ہماری زیادہ کیمیائی تعامل یعنی (High pH Soils) والی زمینوں میں موجود رہتا ہے۔

300-400 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر تیار شدہ بائیوچار کی pH نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مزید براں خام مواد خود قدرے تیزابی ہوتا ہے۔ پھل اور سبزیاں عام طور پر (Organic acids) نامیاتی تیزاب، پانی، نرم فائبرز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جب یہی مواد بائیوچار میں تبدیل ہوتا ہے تو اس میں تیزابی اجزاء زیادہ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی PH کم ہوتی ہے۔

سبزی و پھل کے بائیوچار میں کاربوکسل فینولک جیسے functional groups زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ہائیڈروجن آئن خارج کرتے ہیں اس لیے مٹی میں ڈالنے پر pH کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ سوائل کیمسٹری سیکشن میں کئے گئے تجربات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اس کے استعمال سے گندم اور مکئی کی فصلات کی پیداوار اور زمین کی پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے۔

سرسوں کا یکم تا 31 اکتوبر تک ہے جبکہ یو اے ایف 11 کا 15 اکتوبر تک ہے۔
تارامیرا کا وقت کاشت بارانی علاقوں میں آخر اکتوبر تک اور آبپاش علاقوں میں
شروع اکتوبر تا وسط نومبر ہے۔

شرح بیج آبپاش علاقوں کے لیے ڈیڑھ تا دو کلوگرام جبکہ بارانی علاقوں میں دو تا
اڑھائی کلوگرام فی ایکڑ رکھیں۔

فصل کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بیج کو پھپھوندی کش زہر تھائیوفینیٹ
میتھائل بحساب اڑھائی گرام فی کلوگرام بیج لگا کر کاشت کریں۔

آبپاش علاقوں میں سفارش کردہ فاسفورس اور پوٹاش والی کھاد کی پوری مقدار اور
نائٹرجنی کھاد کی ایک تہائی مقدار بوائی کے وقت اور بقیہ نائٹرجنی کھاد کو دو اقساط میں
یعنی آدھی مقدار پہلے پانی کے ساتھ اور آدھی مقدار پھول آنے سے پہلے
ڈالیں۔ جبکہ بارانی علاقوں میں کھاد کی ساری مقدار بوائی کے وقت ڈالیں۔

تیلدار اجناس کا بیج (NARC) اسلام آباد، پنجاب سیڈ کارپوریشن، مختلف زرعی
تحقیقاتی اداروں مثلاً شعبہ روغن دار اجناس (AARI) فیصل آباد، روغن دار اجناس
ریسرچ اسٹیشن خانپور، ریجنل زرعی تحقیقاتی ادارہ (RARI)، بہاولپور، بارانی
زرعی تحقیقاتی ادارہ (BARI)، چکوال اور مستند پرائیویٹ کمپنیوں سے حاصل کیا
جاسکتا ہے۔

دھان

موٹی اقسام کے لیے کٹائی اور پھنڈائی کا عمل شروع کریں۔ کٹائی اس وقت کریں
جب سٹہ کے اوپر والے دانے پک چکے ہوں اور نیچے والے دو تین دانے ابھی
ہرے ہوں۔ اس وقت دانے میں نمی 20 تا 22 فیصد ہوتی ہے۔ پھنڈائی شدہ
دانوں کو خشک کرنے کا بندوبست کریں تاکہ دانوں میں نمی 12 تا 13 فیصد رہ
جائے۔

فصل کی برداشت اگر مشین سے کروانی ہو تو ترجیحاً رائس ہارویسٹر (کبوٹا) استعمال
کریں اگر رائس ہارویسٹر میسر نہ ہو تو ایسی کمبائن مشین استعمال کریں جس میں
دھان کی کٹائی کیلئے ایڈجسٹمنٹ ہوتا کہ دانے کم ٹوٹیں۔

باسمتی اقسام میں دانہ بھرتے وقت پانی کی کمی نہ آنے دیں۔
باسمتی اقسام کو آخری پانی کٹائی سے 15 تا 18 دن پہلے لگائیں۔

چھیتی اقسام پر پتوں کا جراثیمی جھلساؤ (Bacterial Leaf Blight)،
برگی بھورے دھبے (Brown Leaf Spot) اور بلاسٹ (Paddy Blast)
نیز پتہ لپیٹ سنڈی اور دھان کے تیلہ کے حملہ کی صورت میں زرعی
توسیع اور پیسٹ وارنگ کے مقامی عملے کے مشورہ سے مناسب محفوظ زہروں کا
سپرے جاری رکھیں۔

اچھی پیداوار کے حصول کے لیے دیسی چنے کی اقسام بلکسر 2000،
پنجاب 2008، بھکر 2011، بٹل 2016، نیاب سی ایچ 104، نیاب سی ایچ
2016، تھل 2020، بٹل 2021، بہاولپور چنا 21، بٹل 2022، ٹی جی
سٹرائیکر اور سٹار چنا جبکہ کابلی چنے کی اقسام سی ایم 2008، نور 2009،
نور 2013، ٹمن 2013، نور 2019، روہی چنا 2021 اور نور 2022
کاشت کریں۔

مسور

مسور کی کاشت کے سلسلہ میں زمین کی تیاری شروع کریں۔
منظور شدہ اقسام پنجاب مسور 2009، چکوال مسور، پنجاب مسور
2019، پنجاب مسور 2020 اور مرکز 2009 کے بیج کا بندوبست کریں۔
مسور کا وقت کاشت نارووال، راولپنڈی، سیالکوٹ اور چکوال کے لیے آخر اکتوبر
تا نومبر کا پہلا ہفتہ اور بھکر، راجن پور، مظفر گڑھ، جھنگ، منڈ بہاؤ الدین،
گجرات، فیصل آباد اور جنوبی پنجاب کے دوسرے علاقوں کے لیے آخر اکتوبر تا
15 نومبر ہے۔

آبپاش علاقوں میں پودوں کی مناسب تعداد حاصل کرنے کے لیے سفارش کردہ
اقسام کا 90 فیصد گاؤ والا 12 تا 14 کلوگرام اور بارانی علاقوں میں 14 تا 16
کلوگرام فی ایکڑ شرح بیج رکھیں اور زرعی توسیعی عملہ کے مشورہ سے کاشت سے
پہلے بیج کو پھپھوندی کش زہر ضرور لگائیں۔

ایک بوری ڈی اے پی + آدھی بوری ایس او پی + 10 کلوگرام یوریا یا اڑھائی
بوری ایس ایس پی (18%) + آدھی بوری یوریا + آدھی بوری ایس او پی فی ایکڑ
ڈالیں۔

روغن دار اجناس: توریا، رایا اور سرسوں (کینولا)

کاشتکار زیادہ سے زیادہ رقبہ پر کینولا یعنی میٹھی سرسوں کاشت کریں۔ اگر علیحدہ
رقبہ میسر نہ ہو تو ستمبر کاشتہ کماد، چنے، گندم اور برسیم وغیرہ میں کامیابی سے اس کی
مخلوط کاشت کی جاسکتی ہے۔

بیج کے حصول اور کاشت امور کی رہنمائی کے لیے محکمہ زراعت توسیع کے عملہ سے
رجوع کریں۔

ربیع اقسام میں سے کینولا اقسام پی اے آری سی کینولا، رچنا کینولا، خانپور کینولا،
بارانی کینولا، سپر کینولا، ٹی ایم کینولا اور ساندل کینولا دیگر منظور شدہ مخلوط اقسام کا
وقت کاشت شمالی پنجاب میں 20 ستمبر تا 20 اکتوبر، وسطی اور جنوبی پنجاب میں یکم
تا 31 اکتوبر، سپر رایا، خانپور رایا، چکوال رایا، چولستان رایا، کیزولا، بارانی سرسوں،
بارانی سٹار، چکوال سرسوں کا 15 اکتوبر تک اور سرسوں ڈی جی ایل اور روہی

❖ دھان کی فصل کی باقیات کو جلانے کی بجائے رائس سٹرا چا پر کے ساتھ کتر کر کھیت میں ملا دیں تاکہ ان باقیات کی تلفی کے ساتھ زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو۔ کیونکہ جلانے کی وجہ سے جو سموگ اور فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے اس سے بچا جاسکے۔

کماد

❖ فروری کاشتہ فصل کو 20 تا 30 دن کے وقفہ سے آبپاشی جاری رکھیں۔

❖ اگر ستمبر کاشت مکمل نہ ہوئی ہو تو اس کو جلد مکمل کریں۔ صرف محکمہ زراعت کی منظور شدہ اقسام ہی کاشت کریں۔

❖ ستمبر کاشت کے لیے درمیانی زمین میں ساڑھے تین بوری یوریا + اڑھائی بوری ڈی اے پی + دو بوری ایس او پی / پونے دو بوری ایم او پی یا ساڑھے چار بوری یوریا + ساڑھے چھ بوری ایس ایس پی (18%) + دو بوری ایس او پی / پونے دو بوری ایم او پی فی ایکڑ استعمال کریں۔ فاسفورسی اور پوٹاش والی کھادوں کی پوری مقدار اور نائٹروجن کھاد کا 1/4 حصہ بوقت بوائی جبکہ بقیہ نائٹروجن کھاد کا 3/1 حصہ کاشت کے ایک ماہ بعد جبکہ باقی بالترتیب مارچ کے آخر اور اپریل میں مٹی چڑھاتے وقت ڈالیں۔

سبزیات

آلو

❖ آلو کی کاشت کا بہترین وقت اکتوبر کا پورا مہینہ ہے لہذا کاشتکار آلو کی بہتر پیداوار کے لئے آخر اکتوبر تک کاشت مکمل کریں۔

❖ آلو کی تازہ پیداوار بطور بیج نئی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ کاشت سے پہلے بیج کی خوابیدگی کو توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ آلو 8 تا 10 ہفتے پڑا رہنے سے خوابیدگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔

❖ بیماری سے پاک تصدیق شدہ بیج کا استعمال کریں۔

❖ کاشت سے کم از کم 10 تا 12 دن پہلے بیج کو سرد خانے سے نکال لیں اور سایہ دار جگہ پر رکھیں تاکہ بیج باہر کے عام درجہ حرارت سے اپنے آپ کو مانوس کر لے اور اس میں شگوفے پھوٹ آئیں۔

❖ موسم خزاں کی فصل کے لیے شرح تخم 1200 تا 1500 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں۔

❖ اگر گوبر کی کھاد نہیں ڈالی گئی تو عناصر صغیرہ یعنی فیرس سلفیٹ بحساب 10 کلوگرام، مینگانیز سلفیٹ بحساب 4 کلوگرام اور بورک ایسڈ بحساب 2 کلوگرام فی ایکڑ ڈالیں۔

❖ کیمیائی کھادوں میں ڈی اے پی 2¼ بوری + یوریا 1½ بوری + ایس او پی 2 بوری + زنک سلفیٹ (21%) 10 کلوگرام یا نائٹرو فاس 5 بوری + ایس او پی 2 بوری + زنک سلفیٹ (21%) 10 کلوگرام فی ایکڑ زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں۔

❖ آلو کی بہترین اقسام پی آر آئی ریڈ، روبی، صدف، سیالکوٹ ریڈ، ایس ایچ 5، ساہیوال سفید، ساہیوال سرخ، کاسمو، راوی، ستلج، کشمیر اور بنجاب کے علاوہ کروڈا، سپیلی ریڈ، آسٹرس، سانے، موزیکا اور لیڈی روزیٹا کا تصدیق شدہ بیج استعمال کریں۔

لہسن

❖ شمالی پنجاب کے لیے لہسن کا وقت کاشت آخر ستمبر تا وسط اکتوبر اور وسطی اور جنوبی پنجاب کے لیے اکتوبر کا مہینہ ہے۔ منظور شدہ اقسام لہسن گلانی اور ایس اے آر سی جی-1 ہیں۔

❖ تیار شدہ زمین کو پانچ پانچ مرلے کی کیاریوں میں تقسیم کر لیں۔ ہر کیاری کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ پوتھیوں کو ہموار زمین پر لائنوں میں کاشت کریں۔ پوتھی کو زمین میں دو تین سینٹی میٹر گہرا دبا دیا جائے۔ اس کی جڑوں والا حصہ زمین میں رہنا چاہیے اور اوپر والا نوکدار حصہ باہر نظر آئے۔ پودے سے پودے کا فاصلہ چار انچ اور لائنوں کا فاصلہ آٹھ تا دس انچ ہونا چاہیے۔

❖ عام اقسام کے لیے درمیانے اور بڑے سائز کی صحت مند 200 کلوگرام پوتھیاں فی ایکڑ استعمال کریں۔ جبکہ این اے آر سی جی-1 کے لیے شرح بیج 800 کلوگرام فی ایکڑ رکھیں۔

❖ 20 تا 25 ٹن فی ایکڑ گوبر کی کھاد ایک ماہ پہلے کھیت میں ڈال دی گئی ہو تو اچھی پیداوار ممکن ہے۔ دو بوری ڈی اے پی اور دو بوری ایس او پی فی ایکڑ زمین کی تیاری کے وقت استعمال کریں۔

ٹنل ٹیکنالوجی

❖ موسم گرما کی اگیتی سبزیاں اگانے کے لیے محکمہ زراعت کی سفارش کردہ ٹنل ٹیکنالوجی کی عملی تربیت حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے محکمہ زراعت (توسیع) یا ہارٹیکلچر ایکسٹنشن کے عملہ سے رابطہ کریں اور سبزیوں کی اگیتی اور زیادہ پیداوار لے کر اپنی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کریں۔

❖ ٹنل میں کھیرا اور گھیا کدو کی براہ راست کاشت بالترتیب 25 اکتوبر تا 15 دسمبر اور یکم نومبر تا 15 دسمبر کی جاسکتی ہے۔

اکتوبر کیلنڈر 2026

نام پھل	ماہ	نشوونما کا مرحلہ	کاشت اُمور	کھادیں	آپاشی	تحفظ نباتات	پیشگی اقدامات
امروہ	اکتوبر	نئے پھولوں کی آمد جاری، پھل بننے کا عمل شروع	قلمی پودے حاصل کرنے کے لئے پیوند کاری کریں اور پیوند کے اوپر پوٹی تھین کا غڈ چڑھادیں اور باغ میں موجود جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے ہل چلائیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ پودے کی جڑیں زیادہ گہرائی میں نہیں ہوتیں اس لئے گہرا ہل نہ چلائیں ورنہ جڑوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور قلمی پودے حاصل کرنے کے لئے اگر ستمبر میں پیوند کاری نہیں کی گئی تو اس ماہ میں مکمل کریں۔	-----	15 دن کے وقفے سے آپاشی جاری رکھیں	پھل کی مکھی کے خلاف جنسی پھندے لگانے کا عمل جاری رکھیں	
ترشاوہ پھل	اکتوبر	کچھ اقسام کے پھل پکنے کا مرحلہ اور کچھ میں رنگت کی تبدیلی کا مرحلہ۔	باغات میں نئے پودے لگائیں پیوند کاری کا عمل جاری رکھیں۔ تنوں پر نکلنے والے لشکونوں کا معائنہ کریں اور کاٹیں	-----	ایک آپاشی کریں۔	-----	جلد پکنے والی اقسام کے پھل کی فروخت کے انتظامات کریں۔
آم	اکتوبر	بڑھوتری کا آخری مرحلہ	شاخ تراشی مکمل کریں۔ جڑی بوٹی مار زہروں کا آخری سپرے کریں۔	-----	اگر موسم خشک رہے تو 15 اکتوبر تک آپاشی کریں۔	پودوں کے تنوں پر بورڈ وکسچر پیسٹ کریں۔	زمین اور پتوں کا تجزیہ کروانے کے لئے لیبارٹری سے رابطہ کریں۔
کھجور	اکتوبر		نئے پودے لگائیں۔ زیر پچھ کو پودے سے علیحدہ کر کے زمسری میں لگائیں	-----	آپاشی جاری رکھیں	زیر پچھ علیحدہ کرنے کے بعد کھجور کی لال بھونڈی سے بچاؤ کے لیے کلورو پائیریفاس 5 ملی لیٹر فی لٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ گیلی سٹی کے ساتھ زخموں کو بند کریں	-----
انگور	اکتوبر	اس ماہ پودے کی نشوونما سست ہو جاتی ہے۔	پودوں کی مکمل نگرانی رکھیں اور نئے باغ لگانے کا کام فوری طور پر مکمل کریں۔	-----	موسم کی نوعیت، بارش اور زمینی ساخت کے تحت آپاشی کریں۔	-----	-----



خوشخبری

معزز کسان کارڈ ہولڈرز آپ کو استعمال شدہ رقم کی بل ادائیگی کا میسج

15 اکتوبر 2026 کو موصول ہوگا

اپنے ذمے واجب الادا رقم
26 اکتوبر 2026 تک جمع کروانے پر
48 گھنٹوں میں دوبارہ رقم کی واپسی اور

کروڑوں روپے کے قیمتی انعامات
(ٹریکٹرز، موبائل فون، موٹر سائیکل)



کسان کارڈ بل کی ادائیگی قریبی بینک آف پنجاب کی برانچ، انٹرنیٹک ٹرانسفر یا راست آئی ڈی کے ذریعے بھی کی جاسکتی ہے

نظامت اعلیٰ زرعی اطلاعات پنجاب



SCAN FOR WEBSITE

محکمہ زراعت، حکومت پنجاب

ایگر یکلچرل ہیلپ لائن 0800-17000 روزانہ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک



SCAN FOR FACEBOOK



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



سید عاشق حسین کرمانی وزیر زراعت پنجاب کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی وفد کا گلگت بلتستان کا دورہ۔ وفد میں سیکرٹری زراعت پنجاب شکیل احمد میاں، سیکرٹری لائیو سٹاک و ڈیری ڈویلپمنٹ پنجاب احمد عزیز تارڑ، سیکرٹری ایکواکلچر اینڈ فیشریز پنجاب رانا محمد سلیم و دیگر ممبران بھی شریک ہیں



سید عاشق حسین کرمانی وزیر زراعت پنجاب کی زیر صدارت کا میٹنگ برائے زراعت کا اجلاس منعقد ہوا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کی روشنی میں گندم کی پیداوار، خریداری، ٹریسنگ اور قیمت سمیت دیگر متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی سہلی بٹ، پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ خان لغاری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور سیکرٹری زراعت پنجاب و دیگر اعلیٰ افسران شریک ہیں



سید عاشق حسین کرمانی وزیر زراعت پنجاب گندم کی آئندہ فصل کی کاشت اور ٹارگٹ بارے اہم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ خان لغاری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری افتخار علی سہو، سیکرٹری زراعت پنجاب شکیل احمد میاں سمیت محکمہ زراعت کے اعلیٰ افسران شریک ہیں