

# نظامت زرعی اطلاعات پنجاب

21- سر آغا خان سوئم روڈ لاہور

Ph.042-99200731, 99200729, E.mail:mediaresearch34@gmail.com

www.facebook.com/AgriDepartment

## پریس ریلیز

### محکمہ زراعت پنجاب نے دھان کی پیبری کی منتقلی کے لئے سفارشات جاری کر دیں

لاہور: 29 جون 2022 ( ) ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق دھان کے کاشتکار فی ایکڑ زیادہ پیداوار کیلئے موٹی اقسام (اری 6، کے ایس 282، کے ایس کے 133، نیاب اری، نیاب 2013، کے ایس کے 434) کی پیبری کی منتقلی 7 جولائی جبکہ باسستی اقسام (سپر گولڈ، سپر باسستی 2019، سپر باسستی، سپر باسستی 515، چناب باسستی، پنجاب باسستی، پی کے 1121، ایرو بیٹک نیاب، باسستی 2016 اور نور باسستی) کی منتقلی 7 تا 25 جولائی تک کر لیں۔ اس کے علاوہ شاہین باسستی اور کسان باسستی کی پیبری کی منتقلی 15 تا 31 جولائی تک منتقل کر لیں۔ ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے مزید بتایا کہ غیر باسستی فائن اقسام پی کے 386 میں پیبری کی منتقلی 7 تا 25 جولائی اور منظور شدہ ہائبرڈ اقسام کی پیبری کی منتقلی 15 جولائی تک مکمل کر لیں۔ منتقلی کے وقت پیبری کی عمر 25 تا 35 دن ہونی چاہیے۔ اگر لاپ میں جڑی بوٹیاں اُگ آئیں تو ان کے انسداد کیلئے بعد از اُگاؤ والی محکمہ زراعت کی سفارش کردہ زہر سپرے کریں۔ اگر ٹوکے کا حملہ معاشی نقصان کی حد (2 ٹوکے فی نیٹ) تک پہنچ جائے تو پیبری اور اس کے ارد گرد کی وٹوں پر محکمہ زراعت کے مقامی عملے کے مشورہ سے سفارش کردہ زہر کا دھوڑا کریں۔ تنے کی سنڈی کا حملہ جب معاشی حد یعنی 0.5 فیصد سوک تک پہنچ جائے تو محکمہ زراعت کی سفارش کردہ دانے دار زہر ڈالیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کاشت پیبری کی حالت کمزور نظر آئے یا پتوں کا رنگ پیلا ہو تو یوریا کھاد بحساب 250 گرام یا کیلشیم امونیم نائٹریٹ 400 گرام فی مرلہ لاپ کی منتقلی سے 10 دن پہلے چھٹے دیں منتقلی لاپ کیلئے کھیت کی تیاری کے وقت موٹی اقسام کیلئے بعد از گندم کاشت کھیت میں کھادوں کا استعمال بحساب پونے دو بوری ڈی اے پی + سوا بوری ایس او پی فی ایکڑ جبکہ باسستی اقسام کیلئے ڈیرھ بوری ڈی اے پی + ایک بوری ایس او پی فی ایکڑ استعمال کریں۔ اگر سابقہ فصل برسیم یا پھلی دار ہو یا کھیت رویال ہو تو نائٹروجن کھاد کی مقدار 20 فیصد کم کر لیں۔ فصل کی حالت، زمین کی زرخیزی اور سابقہ کاشتہ فصل کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت کے ماہرین کے مشورہ سے کھاد کی مقدار میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ بوران کی کمی کی صورت میں 3 کلوگرام بورک ایسڈ یا 4.5 بوریکس (20 فیصد) فی ایکڑ بوقت تیاری کھیت استعمال کریں۔ لاپ کی منتقلی کے وقت پودوں کی تعداد 80 ہزار اور سوراخوں میں 1 لاکھ 60 ہزار پودے فی ایکڑ رکھیں یعنی 19 انچ کے فاصلے پر فی سوراخ 2 پودے لگائے جائیں۔ منتقلی لاپ کے بعد 3 تا 5 دن کے اندر قبل از اُگاؤ اثر کرنے والی سفارش کردہ جڑی بوٹی مارز ہرشیکر بوتل کے ساتھ کھیت کے اندر پانی میں بکھیر دیں اور پانچ دن تک پانی کھیت میں کھڑا رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے کھیت میں جڑی بوٹیاں اُگ آئیں تو بعد از اُگاؤ اثر کرنے والی زہریں لاپ کی منتقلی کے ایک مہینہ کے اندر استعمال کر لیں۔ دھان کے کاشتکار زنگ کی کمی کی صورت میں کاشت کے دو ہفتے بعد 200 گرام زنگ سلفیٹ (33 فیصد) فی مرلہ زہریں میں استعمال کریں یا پیبری کو کھیت میں منتقل کرنے سے پہلے اس کی جڑوں کو زنگ آکسائیڈ کے 2 فیصد محلول میں ڈبو کر لگائیں