

# نظامت اعلیٰ زرعی اطلاعات پنجاب

21- سر آغا خان سوئم روڈ لاہور

Ph.042-99200731, 99200729, E.mail:mediaresearch34@gmail.com

www.facebook.com/AgriDepartment

## پریس ریلیز

سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل کی زیر صدارت کپاس کے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا اجلاس

کپاس کی موجودہ صورت حال اور جاری ہیٹ ویو کے دوران فصل کی دیکھ بھال کا جائزہ لیا گیا

کپاس کی فصل کو گرمی کی شدت سے بچانے کیلئے مناسب وقفہ سے آبپاشی کریں، سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب

لاہور: 21 مئی 2024: سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل کی زیر صدارت ایگریکلچر سیکرٹریٹ میں کپاس کے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا اجلاس۔ اجلاس میں کپاس کی موجودہ صورت حال اور جاری ہیٹ ویو کے دوران فصل کی دیکھ بھال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق حالیہ گرمی کی لہر 27 مئی تک جاری رہے گی۔ ان دنوں کے دوران دن رات کا درجہ حرارت معمول سے 4 تا 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا لہذا فارمیٹرز 31 مئی تک کپاس کی کاشت مکمل کرنے کیلئے کاشتکاروں کی رہنمائی و معاونت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ ہیٹ ویو کے پیش نظر کپاس کی کاشت ترجیحاً کھیلپوں پر کریں اور شرح بیج میں مناسب اضافہ کریں۔ اس موقع پر بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اس وقت کپاس کی فصل پر کسی بھی کیڑے کا حملہ نقصان کی معاشی حد زیادہ نہیں۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب نے فیلڈ فارمیٹرز کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کپاس کی فصل کے ابتدائی 60 دن اہم ہیں اس دوران نقصان دہ کیڑوں کے تدارک کیلئے کسی بھی قسم کے زرعی زہر کا سپرے کرنے سے فصل دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو دست کیڑے بھی مرجاتے ہیں جس سے پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ اس موقع پر ماہرین کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی کہ کاشتکار شدید گرم موسمی حالات میں کپاس کی فصل کی باقاعدہ نگرانی اور کھیتوں میں مناسب وقفہ سے ہلکی آبپاشی ترجیحاً شام یا رات کے اوقات میں کریں۔ کپاس کی بوائی سے پہلے زمین کو سب سوائلر یا چیزل کے ذریعے گہرا ہل چلانے کے بعد راونی کریں۔ کپاس کی بوائی ترجیحاً شام کے وقت کریں۔ فصل کو پوناش، بوران، زنک اور سلفر کا سپرے پودوں کو ضروری غذائی اجزاء کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس ضمن میں کپاس کے کاشتکار 300 گرام پوناش، 250 گرام بوران، 250 گرام زنک، 150 گرام کاپر اور 150 گرام میکینیز پر مشتمل محلول فی ایکڑ سپرے کریں۔ جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی اور کیڑوں کے قدرتی کنٹرول کے طریقے گرمی کے دباؤ کی وجہ سے فصل میں پیچیدگیوں کے خطرات میں کمی لاسکتے ہیں۔ پھول اور پھل کے کیراکی صورت میں نشوونما کو تیز کرنے والے مرکبات (بائیوسٹولیٹ/امائیٹوایسڈ) سپرے کریں۔

0-0-0-0-0