

نظامت زرعی اطلاعات پنجاب

21- سر آغا خان سوئم روڈ لاہور

Ph.042-99200731, 99200729, Fax No.042/99202911 E.mail:ziratnama@hotmail.com
www.facebook.com/AgriDepartment

پریس ریلیز

محکمہ زراعت پنجاب نے ماہ جولائی کے دوسرے پندرہ واڑے میں کپاس کی فصل کی بہتر نگہداشت کیلئے سفارشات جاری کر دیں۔
لاہور 16 جولائی 2021: محکمہ زراعت پنجاب نے کپاس کی فصل کی بڑھوتری کیلئے سفارشات جاری کر دیں۔ ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق حالیہ بارشوں کی وجہ سے جڑی بوٹیاں تیزی سے اُگ آتی ہیں جو کہ فصل کو دی گئی خوراک میں حصہ دار بن جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیڑوں کی پناہ گاہ بھی ثابت ہوتی ہیں اس لئے کاشتکار کو ڈی کر کے یا ہاتھ کے ساتھ جڑی بوٹیاں تلف کر دیں۔ جڑی بوٹی مار سپرے کیلئے فلیٹ فین نوزل استعمال کریں اور پانی کی مقدار 100 تا 120 لیٹر فی ایکڑ استعمال کریں اور ایسی زہریں جن کے استعمال سے فصل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو شیلڈ لگا کر سپرے کریں۔ کپاس کی فصل کی آبپاشی زمین کی زرخیزی، طریقہ کاشت، ورائٹی اور فصل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ مزید براں آبپاشی کا وقفہ واٹر سکاؤٹنگ کر کے کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ لائنوں میں کاشتہ کپاس کی فصل کو 12 تا 15 دن کے وقفے سے آبپاشی کریں جب کہ پٹریوں پر کاشتہ کپاس کی فصل کو 15 دن بعد پانی لگائیں اور بقیہ پانی بھی 15 دن کے وقفے سے لگائیں۔ مٹی میں کاشتہ فصل کیلئے 1/5 نائٹروجن بجائی کے وقت، 1/5 بجائی سے 30 تا 35 دن بعد، 1/5 حصہ ڈوڈیاں بننے اور بقیہ 1/5 ٹینڈے بننے وقت استعمال کریں۔ کپاس کی فصل پر زنک اور بوران کی کمی کی علامات ظاہر ہونے پر ان کے تین سپرے بوائی کے بالترتیب 45، 60 اور 90 دن بعد کریں۔ سپرے کا محلول بنانے کیلئے 100 لیٹر پانی میں بورک ایسڈ 17 فیصد بحساب 300 گرام زنک سلفیٹ، 33 فیصد بحساب 250 گرام حل کریں۔ زنک اور بوران کو دوسرے کیڑے مارا دویات کے ساتھ ملا کر سپرے نہ کریں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ حالیہ نمی والے موسم میں کپاس کی فصل پر رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ خصوصاً چست تیلے اور سفید مکھی کے حملے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لئے کاشتکار کپاس کی فصل کی ہفتہ میں دو بار پیسٹ سکاؤٹنگ کریں اور اگر کوئی ضرر رساں کیڑا نقصان کی معاشی حد سے تجاوز کرے تو محکمہ زراعت کے مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے نئی کیمسٹری کی حامل زہروں کا سپرے کریں۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ نائٹروجنی کھاد اوریہ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ مشاہدے میں آیا ہے لہذا فصل کو حسب ضرورت نائٹروجنی کھاد مناسب وقفے سے سفید مکھی کے حملے کی شدت دیکھتے ہوئے ڈالی جائے۔ اگر کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ زیادہ ہو تو نائٹروجنی کھاد کا استعمال سفید مکھی کے حملے کے بعد کریں

