

نظامت زرعی اطلاعات پنجاب

21۔ سر آغا خان سوئم روڈ لاہور

Ph.042-99200731, 99200729, Fax No.042/99202911 E.mail:ziratnama@hotmail.com

www.facebook.com/AgriDepartment

پریس ریلیز

محکمہ زراعت پنجاب نے 15 مئی تک کپاس کی فی ایکڑ بہتر پیداوار کیلئے سفارشات جاری کر دیں

لاہور: 02 مئی 2023 () ترجمان محکمہ زراعت نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کپاس کے بیج تھیلے پر 1 ہزار روپے فی بیگ سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ یہ سبسڈی تھیلوں میں موجود واؤچر کے ذریعے کاشتکاروں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں کپاس کی منتخب منظور شدہ اقسام بی ایس-15، بی آئی ایم-663، سی کے سی-1، سی کے سی-3، ایف ایچ-490، آئی یو بی-2013، ایم این ایچ-1020، نیجی-11، نیاب-545، نیاب-878، نیاب-1048، نیاب کرن کی کاشت پر جسرڈ کاشتکاروں کو 5 ایکڑ تک سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے کاشتکار 10 مئی تک کاشتہ فصل کیلئے 17 ہزار 5 سو سے 20 ہزار تک رکھیں۔ کاشتکار کپاس کی دوسری منظور شدہ بی ٹی اقسام کا انتخاب اپنے علاقے، زمین کی قسم، پانی کی دستیابی اور محکمہ زراعت (توسیع) کے مقامی عملے کے مشورہ سے کریں۔ بی ٹی اقسام کے ساتھ 10 فیصد رقبہ نان بی ٹی اقسام بھی کاشت کریں تاکہ حملہ آور سنڈیوں میں بی ٹی اقسام کے خلاف قوتِ مدافعت پیدا ہو سکے۔ اگر بیج کا اگ 75 فیصد یا زیادہ ہو تو کاشت کیلئے بر اتر 6وا 6 کلوگرام جبکہ بر دار بیج 8 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں۔ کاشتکار بوائی سے قبل بیج کو مناسب کیڑے مار دوائی لگائیں تاکہ فصل ایک ماہ تک رس چوسنے والے کیڑوں بالخصوص سفید مکھی کے حملے سے محفوظ رہے۔ بیج کو بیماریوں سے بچانے کیلئے محکمہ زراعت (توسیع) کے عملے کے مشورہ سے مناسب پھپھوندی کٹش زہر بھی لگائیں۔ کپاس کی کاشت ترجیاً پٹریوں پر کریں جس کیلئے مشینی طریقہ استعمال کریں یا ہاتھ سے چوپا لگائیں۔ اگر کپاس کی کاشت ڈرل سے کرنی ہو تو قطاروں کا فاصلہ اڑھائی فٹ رکھیں اور جب پودوں کا قد ایک سے دو فٹ ہو جائے تو پودوں کی ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن پر مٹی چڑھا دیں۔ کپاس کی کاشت ترجیاً پٹریوں پر کریں۔ پٹریوں پر کاشتہ فصل میں جڑی بوٹیوں کا انسداد آسان، کھادوں کا استعمال بہتر، پانی اور بارشوں سے ہونے والے نقصان سے بھی بچت ہوتی ہے۔ ڈرل سے کاشتہ فصل کیلئے پہلی آبپاشی بوائی کے 30 تا 35 دن بعد اور بقیہ 12 سے 15 دن کے وقفے سے کریں۔ پٹریوں پر کاشتہ فصل کیلئے بوائی کے بعد پہلا پانی 3 تا 4 دن، دوسرا، تیسرا اور چوتھا پانی 6 تا 7 دن کے وقفے سے جبکہ بقیہ پانی 12 دن کے وقفے سے حسب ضرورت لگائیں۔ کاشتکار پودوں کی تعداد پوری کرنے کیلئے چھدرائی کے عمل سے زائد پودے نکال دیں۔ چھدرائی کا عمل بوائی کے 20 تا 25 دن کے اندر یا پہلے پانی سے پہلے یا خشک گوڈی کے بعد ہر حالت میں ایک ہی دفعہ میں مکمل کریں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ کاشتکار کھادوں کا استعمال زمین کے تجزیہ کی بنیاد پر کریں اور زنک اور بوران کی کمی کی صورت میں زنک سلفیٹ 33 فیصد 5 کلوگرام فی ایکڑ اور بورک ایسڈ 17 فیصد اڑھائی کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں