

نظامت اعلیٰ زرعی اطلاعات پنجاب

21- ڈیوس روڈ لاہور

Ph.042-99200731, 99200729, E.mail:mediaresearch34@gmail.com

www.facebook.com/AgriDepartment

پریس ریلیز

محکمہ زراعت پنجاب نے 15 جولائی تک کپاس کے ضرر رساں کیڑوں کے تدارک کے لیے حکمت عملی جاری کر دی

لاہور: 02 جولائی 2025: ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق کپاس کے کاشتکار سفید مکھی کے تدارک کیلئے اگیتی فصل کی خاص طور پر ہفتے میں دو بار پیسٹ سکاؤٹنگ کریں اور کپاس کی فصل کے کھیت اور اسکے ارد گرد جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کریں۔ اس کے علاوہ متبادل میزبان فصلات پر سفید مکھی کا بروقت تدارک کریں۔ کاشتکار کپاس کی فصل کو پانی کی کمی ہرگز نہ آنے دیں اور فصل کی ضرورت اور موسمی حالات کے مطابق آبپاشی کریں۔ سفید مکھی کے کنٹرول کیلئے 20 پیلے چکنے والے کارڈز فی ایکڑ لگائیں اور ہر 15 دن کے وقفے کے بعد چکنے والا گلو دوبارہ لگائیں۔ سفید مکھی کے نقصان کی معاشی حد 5 بالغ یا بچہ یادوں ملا کرنی پڑے ہو تو محکمہ زراعت پنجاب کے مقامی عملہ کے مشورہ سے سپرے کریں۔ کاشتکار ایک ہی کیمسٹری کی زرعی زہروں کے بار بار استعمال سے گریز کریں اور سپرے سے پہلے سپرے مشین کی کیلی بریشن کریں۔ سپرے کیلئے ترجیحاً ہالوکون نوزل اپاؤر سپرئیر کا استعمال کریں۔ ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے مزید کہا کہ کپاس کے کاشتکار چست تیلے کے تدارک کے لیے متبادل میزبان فصلات خاص طور پر کپاس کے کھیت کے قریب بھنڈی اور مینگن پر چست تیلے کو کنٹرول کریں۔ چست تیلے کے نقصان کی معاشی حد اگر ایک بالغ یا بچہ فی پتہ یا اس سے زیادہ ہو جائے تو محکمہ زراعت توسیع یا پیسٹ وارنگ کے مقامی عملہ کے مشورہ سے زرعی زہروں کا سپرے کریں۔ اگر کپاس کی فصل پر تھرپس کا حملہ ہو تو اس کے کنٹرول کے لیے ہفتے میں کم از کم دو بار پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔ کپاس کی فصل کے کھیت اور اسکے ارد گرد جڑی بوٹیوں کا خاتمہ یقینی بنائیں۔ کپاس کی فصل کو پانی کی کمی نہ آنے دی جائے کیونکہ تھرپس سب سے زیادہ نقصان گرم اور خشک موسم میں ہی کرتا ہے۔ اگر زرہر پاشی کرنی مقصود ہو تو محکمہ زراعت توسیع یا پیسٹ وارنگ کے عملہ کے مشورے سے معاشی نقصان کی حد 8 سے 10 بالغ یا بچے فی پتہ ہو جائے تو کریں۔ کپاس کے کاشتکار گلابی سنڈی کے حملے کا بروقت پتہ لگانے کے لئے ہفتے میں دو بار کپاس کی فصل کی پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔ مانیٹرنگ کے لئے گلابی سنڈی کے جنسی پھندے 1 تا 2 عدد فی ایکڑ جبکہ اس کے مکمل کنٹرول کے لئے 9 تا 12 جنسی پھندے فی ایکڑ لگائیں اور ہر 15 دن کے وقفے سے فیرومون کپسول کو تبدیل کریں یا لمبے عرصے والے فیرومون استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ٹرائیکوگراما کارڈز 20 عدد فی ایکڑ لگائیں اور ہر 15 دن کے بعد کارڈز دوبارہ تبدیل کر لیں۔