

# نظامت زرعی اطلاعات پنجاب

21- سر آغا خان سوئم روڈ لاہور

Ph.042-99200731, 99200729, E.mail:mediaresearch34@gmail.com

www.facebook.com/AgriDepartment

## پریس ریلیز

### محکمہ زراعت پنجاب نے دھان کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار کیلئے سفارشات جاری کر دیں

لاہور: 04 جولائی 2023 ( ) ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق دھان کے کاشتکار فی ایکڑ زیادہ پیداوار کیلئے باسستی اقسام کی منتقلی 25 جولائی تک کر لیں۔ اس کے علاوہ شاہین باسستی اور کسان باسستی کی پیوری کی منتقلی 15 تا 31 جولائی تک منتقل کر لیں۔ ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے مزید بتایا کہ غیر باسستی فائن اقسام پی کے 386 میں پیوری کی منتقلی 25 جولائی اور منظور شدہ ہاہرڈ اقسام کی پیوری کی منتقلی 15 جولائی تک مکمل کر لیں۔ منتقلی کے وقت پیوری کی عمر 25 تا 35 دن ہونی چاہیے۔ اگر لابل میں جڑی بوٹیاں اُگ آئیں تو ان کے انسداد کیلئے بعد از اُگاؤ والی محکمہ زراعت کی سفارش کردہ زہر سپرے کریں۔ اگر ٹوکے کا حملہ معاشی نقصان کی حد (2 ٹوکے فی نیٹ) تک پہنچ جائے تو پیوری اور اس کے ارد گرد کی وٹوں پر محکمہ زراعت کے مقامی عملے کے مشورہ سے سفارش کردہ زہر کا دھوڑا کریں۔ تنے کی سنڈی کا حملہ جب معاشی حد یعنی 0.5 فیصد سوک تک پہنچ جائے تو محکمہ زراعت کی سفارش کردہ دانے دار زہر ڈالیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کاشت پیوری کی حالت کمزور نظر آئے یا پتوں کا رنگ پیلا ہو تو یوریا کھاد بحساب 250 گرام یا کیلشیم امونیم نائٹریٹ 400 گرام فی مرلہ لابل کی منتقلی سے 10 دن پہلے چھٹے دیں منتقلی لابل کیلئے کھیت کی تیاری کے وقت موٹی اقسام کیلئے بعد از گندم کاشت کھیت میں کھادوں کا استعمال بحساب پونے دو بوری ڈی اے پی + سوا بوری ایس او پی فی ایکڑ جبکہ باسستی اقسام کیلئے ڈیرہ بوری ڈی اے پی + ایک بوری ایس او پی فی ایکڑ استعمال کریں۔ اگر سابقہ فصل برسیم یا پھلی دار ہو یا کھیت رو یاں ہو تو نائٹروجن کھاد کی مقدار 20 فیصد کم کر لیں۔ فصل کی حالت، زمین کی زرخیزی اور سابقہ کاشتہ فصل کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت کے ماہرین کے مشورہ سے کھاد کی مقدار میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ بوران کی کمی کی صورت میں 3 کلوگرام بورک ایسڈ یا 4.5 بوریس (20 فیصد) فی ایکڑ بوقت تیاری کھیت استعمال کریں۔ لابل کی منتقلی کے وقت پودوں کی تعداد 80 ہزار اور سوراخوں میں 1 لاکھ 60 ہزار پودے فی ایکڑ رکھیں یعنی 9 انچ کے فاصلے پر پنی سوراخ 2 پودے لگائے جائیں۔ منتقلی لابل کے بعد 3 تا 5 دن کے اندر قبل از اُگاؤ اثر کرنے والی سفارش کردہ جڑی بوٹی مارز ہرٹیکر بوتل کے ساتھ کھیت کے اندر پانی میں بکھیر دیں اور پانچ دن تک پانی کھیت میں کھڑا رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے کھیت میں جڑی بوٹیاں اُگ آئیں تو بعد از اُگاؤ اثر کرنے والی زہریں لابل کی منتقلی کے ایک مہینہ کے اندر استعمال کر لیں۔ دھان کے کاشتکار زنک کی کمی کی صورت میں کاشت کے دو ہفتے بعد 200 گرام زنک سلفیٹ (33 فیصد) فی مرلہ زہری میں استعمال کریں یا نیبری کوکھیت میں منتقل کرنے سے پہلے اس کی جڑوں کو زنک آکسائیڈ کے 2 فیصد محلول میں ڈبو کر لگائیں

☆☆☆☆