

نظامت اعلیٰ زرعی اطلاعات پنجاب

21۔ سر آغا خان سوئم روڈ لاہور

Ph.042-99200729, E.mail:mediaresearch34@gmail.com
www.facebook.com/AgriDepartment Twitter:@agri_department

پریس ریلیز

محکمہ زراعت پنجاب نے گندم کی بہتر نگہداشت کیلئے سفارشات جاری کر دیں

لاہور: 20 دسمبر 2023 () ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق کپاس، مکئی اور کما کے بعد کاشتہ گندم کو پہلا پانی بوائی کے 20 تا 25 دن بعد جبکہ دھان کے بعد کاشتہ گندم کو پہلا پانی 35 تا 45 دن بعد لگایا جائے۔ گندم کو بقایا نائٹروجن پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ برابر اقساط میں استعمال کریں جبکہ ریتلی زمینوں میں پہلا پانی لگانے کے بعد نائٹروجن کھاد کا استعمال تروتز میں کریں۔ پہلی آبپاشی کے بعد کھیت وتر حالت میں آنے پر دوہری بارہیر و چلائیں خواہ فصل چھٹھ کے ذریعے ہی کیوں نہ کاشت کی گئی ہو۔ اس سے جڑی بوٹیوں کے انسداد میں مدد ملتی ہے۔ یاد رہے، گندم کی فصل میں جڑی بوٹیوں کا اگاؤ بہت جلد ہوتا ہے اور ان کی نشوونما بھی تیز ہوتی ہے جس سے پیداوار میں 42 فیصد تک کمی واقع ہو سکتی ہے اس لئے جڑی بوٹیوں کی تلفی کیلئے مربوط طریقہ انسداد اختیار کریں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کیلئے کییمیائی زہروں کا استعمال محکمہ زراعت پنجاب کی سفارشات کے مطابق کریں۔ معیاری سپرے کے لئے مخصوص نوزل (ٹی جیٹ یا فلیٹ فین نوزل) استعمال کریں اور پانی کی مقدار فی ایکڑ 100 تا 120 لٹر رکھیں۔ زہر کے چھڑکاؤ کے بعد گوڈی اور بارہیر و کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ریتلے، کلراٹھے نیز بارانی علاقوں میں جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال محکمہ زراعت کے مشورہ سے کریں۔ دھان کے علاقہ جہاں پہلے پانی کے بعد زمین دیر سے تروتز حالت میں آتی ہے وہاں پانی لگانے کے بعد جب کھیت میں کچھڑ ہو تو جڑی بوٹی مار زہریں یوریا کھاد یا ریت میں ملا کر بذریعہ چھٹھ استعمال کریں۔ کاشتکار تیز ہوا، بارش یا دھند میں سپرے نہ کریں اور تریجیاً سپرے دھوپ میں کریں۔ کاشتکار تمام کاشتی امور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرانجام دیں۔

☆☆☆☆